

IDENTIFICACIÓN

95-100 cm. Plumaje negro; infracoberteras de la cola, axilares y partes inferiores blancas; pico y patas rojos.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:
Juveniles con diseño similar al **adulto**, pero con plumas de la cabeza, cuello y pecho gris marrón apagado con puntas claras; resto de partes superiores con tonos apagados; supracoberteras del ala con estrechos márgenes claros; pico verdoso.
2º año con límites de muda entre las plumas negro-morado del **adulto** y las más apagadas del **juvenil**.
Adultos con plumas de la cabeza, cuello y pecho con fuerte brillo morado y verde; supracoberteras del ala sin estrechos márgenes claros; pico rojo brillante.

MUDA

Muda **postnupcial** completa que comienza en periodo de cría y termina durante el invierno. Muda **postjuvenil** completa, comenzando con las plumas corporales en febrero de su 2º año; las plumas del ala comienzan a mudarse en mayo y terminan en invierno.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Cigüeña negra. 2º año: diseño de coberteras primarias (20-VII).



Cigüeña negra. 2º año: diseño de primarias (20-VII).



Cigüeña negra. 2º año: diseño de secundarias (20-VII).



Cigüeña negra. 2º año: diseño del ala (20-VII).