

# 01840 Cerceta común (*Anas crecca*)



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho (18-II)

## IDENTIFICACIÓN

34-38 cm. **Macho** en invierno con cabeza de color castaño con antifaz verde; pecho claro moteado de oscuro; dorso y flancos vermiculados de gris; espejuelo verde y negro bordeado de blanco. **Hembra** de color pardo, con moteado y rayado blanco; espejuelo como el **macho**.



Cerceta común. Diseño del espejuelo.

## ESPECIES SIMILARES

**Macho** con plumaje inconfundible. El diseño del espejuelo del ala y su pequeño tamaño diferencia a la **hembra** del resto de los ánades pardos.

## SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** inconfundible con cabeza de color castaño y antifaz verde; flanco vermiculado de gris; pico oscuro. **Hembra** de color pardo; flancos ocre con manchas claras en forma de "U"; pico gris.



En plumaje **de eclipse** sexos **similares** pero **macho** con secundarias con punta blanca estrecha; 4ª secundaria interna con el espejuelo verde ocupando toda la hemibandera externa; la gran cobertera más interna sin borde blanco; pico oscuro sin motas. **Hembra** con secundarias con punta blanca ancha; 4ª secundaria interna con el espejuelo verde ocupando sólo parte de la hemibandera externa; la gran cobertera más interna con borde blanco; pico con puntos oscuros.



Cerceta común. Plumaje nupcial. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: izquierda macho; derecha hembra.



Cerceta común. Plumaje en eclipse. Determinación del sexo. Diseño del pico: izquierda macho; derecha hembra.



Cerceta común. Determinación del sexo. Diseño de la 4ª secundaria: izquierda macho; derecha hembra.

## EDAD/SEXO

Es improbable encontrar **juveniles** en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

**1ª año/2º año primavera** con las plumas de vuelo y de la cola **juveniles** retenidas, que estarán desgastadas. **Macho** con la terciaria más externa con la banda negra vertical ancha en el borde; grandes coberteras estrechas y con puntas redondeadas con una mancha blanca más o menos teñida de crema.

**Hembra** con la terciaria más externa con la banda negra vertical estrecha en el borde; grandes coberteras estrechas y con puntas redondeadas con una mancha blanca más o menos teñida de crema.

**Adulto** con las plumas de vuelo y de la cola poco desgastadas. **Macho** con la terciaria más externa con una banda gris claro, una banda negro brillante y reborde pálido blanco muy reducido en el borde; grandes coberteras anchas y con puntas cuadradas con una mancha blanca grande teñida de canela intenso. **Hembra** con la terciaria más externa con una banda gris oscuro, una banda negro apagado y reborde pálido blanco ancho en el borde, que frecuentemente bordea la punta; grandes coberteras anchas y cuadradas, con una estrecha mancha blanca o más o menos crema, moteada de gris, en la punta.

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



Cerceta común. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la terciaria más interna: izquierda adulto; derecha 1º año.



Cerceta común. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de la terciaria más interna: izquierda adulto; derecha 2º año.



Cerceta común. Macho. Determinación de la edad. Diseño de las grandes coberteras: izquierda adulto; derecha 1º año.



Cerceta común. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de las grandes coberteras: izquierda adulto; derecha 1º año.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa adquiriendo el plumaje de **eclipse**, que suele estar terminada a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando plumas del cuerpo, cola y terciarias, generalmente terminada entre octubre y noviembre. Ambas clases de edad, a partir de septiembre, tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje **nupcial**.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival      ■ Residente  
■ Invernante      ■ En paso

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra (18-II)



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho ( )



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra (18-II)



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-II); abajo hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho ( ); abajo hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del capirote y el pico: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del capirote y el pico: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (18-II); abajo hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del flanco (18-II).

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del flanco (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del flanco ().



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño del flanco (18-II).




Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la terciaria más externa: izquierda macho (18-II); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la terciaria más externa: izquierda macho (); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño de grandes coberteras (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño de grandes coberteras (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño de grandes coberteras ().



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño de grandes coberteras (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño de primarias (18-II).




Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño de primarias (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño de primarias ().



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño de primarias (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Diseño de la 4ª secundaria interna: izquierda macho  
(18-II); derecha hembra (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Diseño de la 4ª secundaria interna: izquierda macho  
(); derecha hembra (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Macho: diseño de secundarias (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño de secundarias (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño de secundarias ().



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del ala (18-II).



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del ala (18-II).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del ala ().



Cerceta común. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño del ala (18-II).

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho (21-IX)



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra (22-IX)



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra ()



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (21-IX); abajo hembra ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho (04-IX)



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (04-IX); abajo hembra (22-IX).



**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)




**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del capirote y el pico: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ( ).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (21-IX); abajo hembra ( ).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del capirote y el pico: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del pecho: arriba macho (04-IX); abajo hembra (22-IX).



**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().

**01840 Cerceta común** (*Anas crecca*)



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño del flanco (21-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño del flanco ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño del flanco (04-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño del flanco (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la terciaria más externa: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().




Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la terciaria más externa: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de grandes coberteras (21-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño de grandes coberteras ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de grandes coberteras (04-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de grandes coberteras (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de primarias (21-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().





Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de primarias (04-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de primarias (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la 4ª secundaria interna: izquierda macho (21-IX); derecha hembra ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la 4ª secundaria interna: izquierda macho (04-IX); derecha hembra (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de secundarias (21-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.  
Hembra: diseño de secundarias ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.  
Macho: diseño de secundarias (04-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.  
Hembra: diseño de secundarias (22-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.  
Macho: diseño del ala (21-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto.  
Hembra: diseño del ala ().



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.  
Macho: diseño del ala (04-IX).



Cerceta común. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.  
Hembra: diseño del ala (22-IX).