

## IDENTIFICACIÓN

42-49 cm. **Macho** con cabeza y cuello castaños; pecho y parte posterior del cuerpo negros; alas y cuerpo grises. **Hembra** de color pardo, más oscuro en el dorso y más claro en la cabeza; alas grises.

## ESPECIES SIMILARES

**Macho** con plumaje inconfundible. El contraste entre el cuerpo más gris que la cabeza y el pico oscuros con una línea central clara diferencia a la **hembra** del resto de los porrones.

## SEXO

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza de color castaño-rojizo, pecho y parte trasera negros; cuerpo gris vermiculado; coberteras del ala vermiculadas de gris; iris rojizo; en plumaje **no nupcial** con diseño similar pero con los colores más apagados.

**Hembra** con cuerpo marrón, más claro en cabeza y pecho; coberteras del ala gris-marrón; iris marrón o amarillo marrón. En aves **juveniles**, el **macho** con coberteras del ala, manto y escapulares ligeramente vermiculadas o con moteado claro en las puntas; punta de secundarias centrales con moteado blanco en la barba externa. **Hembra** con coberteras del ala, manto y escapulares de color gris-marrón uniforme, con un ligero moteado claro en la punta; secundarias son moteado.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con plumas de la cola estrechas; pequeñas y medianas coberteras gris-marrón uniforme, estrechas y con la punta redondeada; grandes coberteras gris marrón redondeadas y estrechas, con poco o sin moteado blanco; primarias externas estrechas sin brillo; sin estría clara detrás del ojo.

**1ª año otoño/2º año primavera** con plumas juveniles retenidas. **CUIDADO:** la variación individual en el tiempo de muda es grande, habiendo desde ejemplares con sólo plumas corporales cambiadas hasta otros con terciarias o plumas de vuelo mudadas.

**Adultos** con coberteras del ala grises, vermiculadas de blanco, anchas y con punta redondeada; **hembra** con estría clara detrás del ojo.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo; se mantiene durante todo el invierno pudiendo algunos ejemplares cambiar terciarias, todas o algunas plumas de la cola y alguna pluma de vuelo. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

## FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso