



Alimoche común. Adulto (14-III).

### IDENTIFICACIÓN

58-70 cm. **Adulto** de color blanco, excepto el negro de las plumas del ala; cabeza y garganta sin plumas, de color amarillo. **Juvenil** de color pardo oscuro.

### ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje y tamaño similar.

### MUDA

Muda **postnupcial** parcial, no cambiando anualmente todas las plumas de vuelo; el periodo de muda comienza después de la cría, para detenerse antes de la migración y terminar en las áreas de invernada. La muda **postjuvenil** comienza en el **2º año**, reteniendo algunas plumas de vuelo que son cambiadas en su **3º año**; periodo de muda entre marzo y noviembre.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso

### EDAD

Pueden reconocerse 5 tipos de edad (**CUIDADO:** existen factores individuales (diferente metabolismo, calidad de la alimentación, época de nacimiento, por ejemplo) que hace que la muda de aves tan grandes no siempre siga el ciclo anual aquí descrito):

**Juvenil** con piel de la cara azulada; plumas de ala y cola de la misma edad; plumaje marrón oscuro; plumas corporales moteadas de gris-marrón; coberteras del ala con punta clara; cola marrón con la punta clara.

**2º año otoño/3º año primavera** parecido al **juvenil**, pero con dos generaciones de plumas de vuelo; partes inferiores con contraste entre los flancos oscuros y el vientre más claro; piel de la cara como en **juveniles**.

**3º año otoño/4º año primavera** con algunas plumas blancas en las partes inferiores e infracoberteras del ala; gorguera con plumas blancas; cola grisante, con bordes claros; piel de la cara como en **juveniles**, pero con base del pico amarillenta.

**4º año otoño/5º año primavera** bastante similar al **adulto** pero con plumas blancas y marrones en las infracoberteras del ala; plumas de la cola con mezcla de plumas blancas y grisáceas; plumas corporales y coberteras del ala con algunas plumas marrones.

**Adulto** con piel de la cara amarilla; plumaje corporal blanco; grandes coberteras internas y primarias negras; gorguera con todas las plumas blancas.

**NOTA:** todo el reportaje fotográfico se ha realizado durante varios años seguidos a un único ejemplar depositado en el Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida)



Alimoche común. 4º año otoño (15-IX).

**02470 Alimoche común** (*Neophron percnopterus*)



Alimoche común. 3º año otoño (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño (26-VII).



Alimoche común. Juvenil (01-XI).



Alimoche común. Adulto: diseño de la cabeza (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de la cabeza (15-IX).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de la cabeza (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de la cabeza (26-VII).



Alimoche común. Juvenil: diseño de la cabeza (01-XI).

**02470 Alimoche común** (*Neophron percnopterus*)



Alimoche común. Diseño del capirote: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño (15-IX).



Alimoche común. Diseño del capirote: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño del pecho: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño (15-IX).



Alimoche común. Diseño del pecho: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño del dorso: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño (15-IX).

**02470 Alimoche común** (*Neophron percnopterus*)



Alimoche común. Diseño del capirote: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño de la cola: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño (15-IX).




Alimoche común. Diseño de la cola: arriba izquierda 3º año otoño (14-III); arriba derecha 2º año otoño (10-IX); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño de las patas. De arriba hacia abajo: adulto (14-III); 4º año otoño (15-IX); 3º año otoño (10-IX); 2º año otoño (26-VII); juvenil (01-XI).

**02470 Alimoche común** (*Neophron percnopterus*)



Alimoche común. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (14-III); abajo 4º año otoño (15-IX).



Alimoche común. Diseño de terciarias: izquierda adulto (14-III); derecha 4º año otoño (15-IX).



Alimoche común. Diseño de coberteras primarias: arriba 3º año otoño (10-IX); centro 2º año otoño (26-VII); abajo juvenil (01-XI).



Alimoche común. Diseño de terciarias: arriba izquierda 3º año otoño (10-IX); arriba derecha 2º año otoño (26-VII); izquierda juvenil (01-XI).



Alimoche común. Adulto: diseño de infracoberteras del ala (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de infracoberteras del ala (15-IX).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de infracoberteras del ala (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de infracoberteras del ala (26-VII).



Alimoche común. Juvenil: diseño de infracoberteras del ala (01-XI).

<http://blascozumeta.com>



Alimoche común. Adulto: diseño de primarias (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de primarias (15-IX).

<http://www.aranzadi.eus>



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de primarias (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de primarias (26-VII).



Alimoche común. Juvenil: diseño de primarias (01-XI).



Alimoche común. Adulto: diseño de secundarias (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño de secundarias (15-IX).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño de secundarias (10-IX).



Alimoche común. 2º año otoño: diseño de secundarias (26-VII).



Alimoche común. Juvenil: diseño de secundarias (01-XI).



Alimoche común. Adulto: diseño del ala (14-III).



Alimoche común. 4º año otoño: diseño del ala (15-IX).



Alimoche común. 3º año otoño: diseño del ala (10-IX).

<http://blascozumeta.com>



Alimoche común. 2º año otoño: diseño del ala (26-VII).



Alimoche común. Juvenil: diseño del ala (01-XI).

<http://www.aranzadi.eus>