




Aguilucho cenizo. Adulto. Macho (25-IV)

IDENTIFICACIÓN

41-46 cm. **Macho adulto** con cabeza y dorso gris; partes inferiores grises en el pecho y blancas en el resto; primarias de color negro y una banda negra en las secundarias; cola de color gris; obispillo claro. **Hembra adulta** con dorso pardo oscuro; partes inferiores pardo claro rayado de oscuro; obispillo blanco, poco definido; alas y cola barreadas de oscuro. **Juveniles** como la **hembra**, pero partes inferiores rojizas, sin rayar. La 10ª primaria tiene una longitud similar a la 6ª; el inicio de la emarginación en la 9ª primaria no está oculto por las coberteras primarias.



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra. Fórmula alar: emarginación de la 9ª primaria no oculta por las coberteras primarias; longitud de la 10ª primaria similar a la 6ª.



Aguilucho cenizo. Adulto. Macho: diseño del ala.

ESPECIES SIMILARES

El **macho** adulto parecido al del **aguilucho pálido**, que tiene el obispillo blanco, carece de barras alares y no tiene estrías en flanco y vientre. La **hembra** y **juveniles** se diferencian de los del **aguilucho lagunero** por carecer de una mancha blanca en la cabeza y garganta; la **hembra** del **aguilucho pálido** tiene el obispillo más blanco y carece de una banda justo debajo de las coberteras; la 10ª primaria cae entre la 5ª y la 6ª; el inicio de la emarginación en la 9ª primaria está oculto por las coberteras primarias. Los **juveniles** de **aguilucho pálido** tienen el pecho estriado.



Aguilucho lagunero. Juvenil



Aguilucho pálido. Macho.



Aguilucho pálido. Hembra



MUDA

Muda **postnupcial** completa comenzando en las zonas de reproducción, suspendida durante la migración y terminada en las áreas de invernada. La muda **postjuvenil** comienza en el **1º invierno** abarcando plumas corporales, algunas coberteras alares y ocasionalmente algunas plumas de la cola; la primera muda completa tiene lugar en el otoño del **2º año** al mismo tiempo que los **adultos**.

EDAD/SEXO

Pueden reconocerse 4 tipos de edad en **hembras** y 5 en **machos**:

Juvenil con partes inferiores ocre y lisas aunque a veces con rayado oscuro fino en el pecho; coberteras del ala con borde ocre intenso; secundarias con intenso tono oscuro por encima y por debajo; plumaje nuevo sin límites de muda. **Macho** con iris gris y parte inferior de las primarias externas con moteado oscuro; **hembra** con iris marrón oscuro y parte inferior de las primarias externas con barrado oscuro.

2º año macho con iris amarillo oscuro; pecho teñido de gris; si las plumas centrales de la cola han sido mudadas, entonces de color gris uniforme; infracoberteras del ala intensamente moteadas de castaño rojizo.

2º año hembra con iris marrón oscuro; parte superior del pecho listada pero el vientre todavía juvenil y liso; si hay mudadas plumas de la cola, entonces de color marrón oscuro y con bandas.

CUIDADO: ambos sexos con todas las plumas de vuelo **juveniles** pero en otoño, una vez comenzada la muda, con mezcla de plumas de vuelo nuevas de **adulto** y viejas de **juvenil**.

3º año macho similar a los **adultos** pero con partes superiores y coberteras del ala gris apagado con tinte marrón; a veces con algunas plumas marrones **juveniles** retenidas en la cabeza o el obispillo; plumas externas de la cola con barras anchas y color castaño rojizo; rayado en la parte inferior del pecho ancho y lanceolado; infracoberteras del ala con bastante moteado castaño rojizo, cubriendo más superficie que en los **machos adultos**.

3º año hembra frecuentemente con el iris marrón o ámbar; dorso oscuro; cabeza oscura con contraste parecido al de los **juveniles**; plumas centrales de la cola más marrones que grises, con barrado poco marcado; plumas externas de la cola con barras anchas y color castaño rojizo claro; plumas del ala bastante similares a las de la **hembra adulta**; partes inferiores con tinte ocre claro listado de marrón en el pecho.

4º año sólo en algunos **machos** con un ligero tinte marrón en la nuca.

Adulto macho con iris amarillo brillante; sin plumas marrones en la nuca o el obispillo; dorso y coberteras del ala gris ceniza uniforme; secundarias y primarias internas grises; primarias externas negras; plumas centrales de la cola gris plateado; plumas externas de la cola con barras ligeramente marcadas; parte superior del pecho grises y lisas, la inferior con listado estrecho; infracoberteras del ala con moteado castaño rojizo poco marcado.



EDAD/SEXO

Adulto hembra con iris amarillo; dorso gris marrón claro; cabeza clara y uniformemente moteada; primarias y plumas centrales de la cola con nítido tinte gris y barrado bien marcado; en el reverso, secundarias con el mismo diseño que el de las primarias y barrado bien marcado; partes inferiores ocre claro con listado marrón oscuro en el pecho.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Aguilucho cenizo. Datación del sexo. Juveniles. Diseño del barrado de la parte inferior de las primarias externas y color del ojo: arriba macho; abajo hembra.

02630 Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Hembra. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.




Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Hembra. Color del iris: arriba adulto; centro 3º año; abajo 2º año.



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Hembra. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; centro 3º año; derecha juvenil.



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Macho. Diseño de la cabeza: arriba izquierda adulto; arriba derecha 3º año; izquierda 2º año.



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Macho. Diseño de la nuca: arriba izquierda adulto; arriba derecha 4º año; izquierda 3º año.



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Macho. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; centro 3º año; derecha juvenil.

02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. Datación de la edad. Macho. Diseño de las infracioberteras del ala: arriba adulto; abajo 3º año.



Aguilucho cenizo. 3º año. Hembra (30-V)



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra (14-V)



Aguilucho cenizo. 2º año. Macho (26-VI)



Aguilucho cenizo. 4º año. Macho (13-VI)



Aguilucho cenizo. 2º año. Hembra (26-VI)



Aguilucho cenizo. 3º año. Macho (26-VI)



Aguilucho cenizo. Juvenil. Macho (10-VII)

02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. Juvenil. Hembra (06-IX)



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (25-IV), abajo hembra (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año. Macho: diseño de la cabeza y color del iris (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño de la cabeza y color del ojo: arriba macho (26-VI); abajo hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño de la cabeza y color del ojo: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño de la cabeza y color del ojo: arriba macho (10-VII); abajo hembra (06-IX).




02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. Pollo. Diseño de la cabeza y color del ojo: arriba macho (24-VII); abajo hembra (24-VII).




Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño del capirote: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (25-IV), derecha hembra (14-V).




Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (10-VII); derecha hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño del capirote (13-VI).



02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)




Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (25-IV), derecha hembra (14-V).





Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño de la nuca (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (10-VII); derecha hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (25-IV), derecha hembra (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño del pecho (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño del pecho: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).

02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)




Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (10-VII); derecha hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (25-IV); abajo hembra (14-V).




Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño del flanco (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño del flanco: arriba macho (26-VI); abajo hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño del flanco: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (10-VII); abajo hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (25-IV); derecha hembra (14-V).

02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño del dorso (13-VI).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño del dorso: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (30-V).




Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (10-VII); derecha hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (25-IV); derecha hembra (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño del obispillo (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño del obispillo: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño del obispillo: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda macho (10-VII); derecha hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Macho: diseño de la cola (25-IV).



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra: diseño de la cola (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño de la cola (13-VI).



Aguilucho cenizo. 2º año. Macho: diseño de la cola (26-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Macho: diseño de la cola (26-VI).



Aguilucho cenizo. 2º año. Hembra: diseño de la cola (26-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Hembra: diseño de la cola (30-V).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Macho: diseño de la cola (10-VII).


02630 **Aguilucho cenizo** (*Circus pygargus*)



Aguilucho cenizo. Juvenil. Hembra: diseño de la cola (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (25-IV); abajo hembra (14-V).




Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño de coberteras primarias (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (26-VI); abajo hembra (30-V).





Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (10-VII); abajo hembra (06-IX).









Aguilucho cenizo. Adulto. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (25-IV); abajo hembra (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año macho: diseño de infracoberteras del ala (13-VI).




Aguilucho cenizo. 3º año. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (26-VI); abajo hembra (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Diseño de infracoberteras del ala: arriba macho (10-VII); abajo hembra (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Macho: diseño de primarias (25-IV).



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra: diseño de primarias (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año. Macho: diseño de primarias (13-VI).

Aguilucho cenizo. 3º año. Hembra: diseño de primarias (30-V).



Aguilucho cenizo. 3º año. Macho: diseño de primarias (26-VI).

Aguilucho cenizo. 2º año. Macho: diseño de primarias (26-VI).



Aguilucho cenizo. 2º año. Hembra: diseño de primarias (26-VI).

Aguilucho cenizo. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (06-IX).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Macho: diseño de primarias (10-VII).

Aguilucho cenizo. Adulto. Macho: diseño de secundarias (25-IV).



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra: diseño de secundarias

Aguilucho cenizo. 3º año. Macho: diseño de secundarias (26-VI).



Aguilucho cenizo. 4º año. Macho: diseño de secundarias (13-VI).

Aguilucho cenizo. 3º año. Hembra: diseño de secundarias (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Macho: diseño de secundarias (26-VI).



Aguilucho cenizo. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (10-VII).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (06-IX).



Aguilucho cenizo. Adulto. Macho: diseño del ala (25-IV).



Aguilucho cenizo. Adulto. Hembra: diseño del ala (14-V).



Aguilucho cenizo. 4º año. Macho: diseño del ala (13-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Macho: diseño del ala (26-VI).



Aguilucho cenizo. 3º año. Hembra: diseño del ala (30-V).



Aguilucho cenizo. 2º año. Macho: diseño del ala (26-VI).





Aguilucho cenizo. 2º año. Hembra: diseño del ala (26-VI).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Macho: diseño del ala (10-VII).



Aguilucho cenizo. Juvenil. Hembra: diseño del ala (06-IX).