

**02670** **Azor común** (*Accipiter gentilis*)



Azor común. Adulto. Macho (06-IV)

**IDENTIFICACIÓN**

**Macho:** 48-61 cm. Alas cortas y redondeadas y cola larga; ojos amarillos o anaranjados; cola con 4-5 bandas pardas; partes superiores pardo-gris; partes inferiores claras finamente estriadas de pardo; cabeza con ceja blanca y mancha auricular oscura. **Juveniles** pardos, con partes inferiores moteadas de pardo.



Azor común. Adulto. Diseño de cabeza y pecho



Azor común. Juvenil. Diseño de cabeza y pecho

**ESPECIES SIMILARES**

Los **cernícalos vulgar** y **primilla** tienen la cola larga, pero sus ojos son oscuros y el dorso es pardo; la hembra de **gavilán** podría confundirse con un macho de **azor**, que son siempre mayores (ala mayor de 289 mm.); los juveniles de **gavilán** tienen las partes inferiores estriadas, mientras los de **azor** son moteadas.



Cernícalo vulgar. Hembra



Gavilán. Juvenil



Gavilán. Hembra

**SEXO**

En **adultos**, **macho** con dorso gris azulado; auriculares gris intenso. **Hembra** con dorso amarronado; auriculares gris claro o marrón. **Hembra** de tamaño mayor que el **macho**. En **juveniles**, el plumaje de ambos sexos es similar pero se pueden sexar por el tamaño.

**CUIDADO:** el diseño de la cabeza y el dorso tiene mucha variación individual; el tamaño en esta especie es muy diferente dependiendo de su localización geográfica (aves norteñas mayores que las meridionales), por lo que sería necesario conocer el origen geográfico para sexar por el tamaño sin errores.



Azor común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Azor común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con cabeza moteada de marrón con lista superciliar tenue; plumas del dorso marrones con borde claro; partes inferiores claras con listado vertical oscuro; iris amarillo claro.

### EDAD

**2º año otoño/3º año primavera** con partes superiores gris marrón con plumas **juveniles** marrones y desgastadas retenidas, especialmente en obispillo y dorso; con algunas plumas **juveniles** marrones retenidas en las coberteras del ala, especialmente en pequeñas y medianas coberteras; plumas del pecho con 3 ó 4 líneas transversales gruesas de color gris marrón, a veces teñidas de ante; a veces con algunas secundarias **juveniles** retenidas, estrechas, marrones y desgastadas; iris amarillo o naranja amarillento.

**Adulto** con pileo y auriculares uniformemente oscuros con lista superciliar blanca bien marcada; plumas del dorso grises o marrón-pizarra uniforme, a veces con plumas ligeramente punteadas de blanco; plumas del pecho con 4 ó 5 líneas transversales finas de color gris marrón, la última más estrecha que el resto; si hay secundarias retenidas son de patrón **adulto**; iris de naranja a rojo.



Azor común. Determinación de la edad. Diseño de las plumas del pecho: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año otoño; izquierda juvenil.



Azor común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

**02670 Azor común** (*Accipiter gentilis*)

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa aunque algunas secundarias centrales son a menudo retenidas; habitualmente terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** comienza en el 2º año y es completa, si bien ocasionalmente algunas secundarias centrales, plumas del obispillo y coberteras del ala son retenidas.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Azor común. Adulto. Hembra (12-XII).



Azor común. 2º año otoño. Hembra (20-XI)



Azor común. Juvenil. Macho (30-VII)



Azor común. 2º año otoño. Macho ()



Azor común. Juvenil. Hembra (06-X)

**02670** **Azor común** (*Accipiter gentilis*)



Azor común. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (06-IV); abajo hembra (12-XII).




Azor común. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-VII); abajo hembra (06-X).



Azor común. 2º año otoño. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (20-XI).



Azor común. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (06-IV); derecha hembra (12-XII).



Azor común. 2º año otoño. Diseño del píleo: izquierda macho (); derecha hembra (20-XI).


**02670** **Azor común** (*Accipiter gentilis*)



Azor común. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (30-VII); derecha hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-IV); derecha hembra (12-XII).



Azor común. 2º año otoño. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (30-VII); derecha hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Diseño de las plumas del pecho: arriba macho (06-IV); abajo hembra (12-XII).



Azor común. 2º año otoño. Diseño de las plumas del pecho: arriba macho (); abajo hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño de las plumas del pecho: arriba macho (30-VII); abajo hembra (06-X).

**02670** **Azor común** (*Accipiter gentilis*)



Azor común. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (06-IV); derecha hembra (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Azor común. 2º año otoño. Diseño del obispillo: izquierda macho (); derecha hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda macho (30-VII); derecha hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-IV); derecha hembra (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Azor común. 2º año otoño. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (30-VII); derecha hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-IV); derecha hembra (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Azor común. 2º año otoño. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (30-VII); derecha hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Diseño de las coberturas primarias: arriba macho (06-IV); abajo hembra (12-XII).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Azor común. 2º año otoño. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (); abajo hembra (20-XI).



Azor común. Juvenil. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (30-VII); abajo hembra (06-X).



Azor común. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (06-IV).



Azor común. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Azor común. 2º año otoño. Macho: diseño de las coberteras del ala ().



Azor común. 2º año otoño. Hembra: diseño de las coberteras del ala (20-XI).



Azor común. Juvenil. Macho: diseño de las coberteras del ala (30-VII).

**02670** **Azor común** (*Accipiter gentilis*)



Azor común. Juvenil. Hembra: diseño de las coberturas del ala (06-X).



Azor común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (12-XII).



Azor común. Adulto. Macho: diseño de primarias (06-IV).



Azor común. 2º año otoño. Macho: diseño de primarias ().

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Azor común. 2º año otoño. Hembra: diseño de primarias (20-XI).



Azor común. Juvenil. Macho: diseño de primarias (30-VII).



Azor común. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (06-X).



Azor común. Adulto. Macho: diseño de secundarias (06-IV).



Azor común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Azor común. 2º año otoño. Macho: diseño de secundarias ().



Azor común. 2º año otoño. Hembra: diseño de secundarias (20-XI).



Azor común. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (30-VII).



Azor común. Juvenil. Hembra: diseño de las secundarias (06-X).



Azor común. Adulto. Macho: diseño del ala (06-IV).



Azor común. Adulto. Hembra: diseño del ala (12-XII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

**FOTO NO  
DISPONIBLE**

Azor común. 2º año otoño. Macho: diseño del ala ().



Azor común. 2º año otoño. Hembra: diseño del ala (20-XI).



Azor común. Juvenil. Macho: diseño del ala (30-VII).



Azor común. Juvenil. Hembra: diseño del ala (06-X).