



Cernícalo primilla. Adulto. Macho (10-V).

IDENTIFICACIÓN

27-33 cm. Alas puntiagudas y cola larga, con banda negra cerca del final; uñas claras; dorso pardo, moteado sólo en la **hembra**; partes inferiores ocre claro, con motas oscuras; cabeza y cola gris y sin estrías en el **macho**, más ocres y estriadas en **hembra** y **juveniles**; primaria más externa más larga que la séptima.



Cernícalo primilla. Hembra: fórmula alar y color de las uñas



Cernícalo primilla. Macho: diseño del ala, cabeza y dorso.

ESPECIES SIMILARES

Puede recordar a un **gavilán**, que tiene dorso gris y ojos amarillos o anaranjados; el dorso ocre del **cernícalo primilla** lo separa del resto de las pequeñas rapaces, excepto del **cernícalo vulgar**, que tiene las uñas oscuras y la primaria más externa similar en longitud a la séptima. Los **machos** de **cernícalo vulgar** tienen el dorso punteado y carecen de franja azulada en las alas.



Gavilán

03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



Cernícalo vulgar. Macho.



Cernícalo vulgar. Hembra: fórmula alar y color de las uñas

SEXO

Macho adulto con cabeza gris, sin moteado; cola, supracoberteras caudales y obispillo uniformemente grises, sin barrado; dorso ocre sin motas; alas con una franja azulada. **Hembra adulta** con cabeza moteada; cola barrada habitualmente con tinte grisáceo; dorso y supracoberteras alares moteados. Los **juveniles** se pueden sexar en casos extremos: **macho** con supracoberteras caudales y plumas de la cola de color gris intenso; pequeñas coberteras escasamente moteadas. **Hembra** con supracoberteras caudales y plumas de la cola sin tinte gris; pequeñas coberteras densamente moteadas. Después de su muda **postjuvenil** ambos sexos tienen las plumas corporales como los **adultos**.



Cernícalo primilla. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Cernícalo primilla. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



Cernícalo primilla. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cola y obispillo: izquierda macho; derecha hembra.



Cernícalo primilla. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de la cola y obispillo: izquierda macho; derecha hembra.



Cernícalo primilla. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de pequeñas coberteras: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
Juvenil con plumaje nuevo y sin trazas de muda en cola y en plumas de vuelo, coberteras primarias con punta clara ancha.
2º año con contraste entre las plumas mudadas con diseño de **adulto** y las **juveniles** retenidas (**CUIDADO:** en **hembras** es a veces difícil separar ambas generaciones de plumas); las plumas de vuelo y de la cola son **juveniles** y bastante desgastadas.
Adulto sin restos de plumas **juveniles** en el cuerpo y alas; plumas de vuelo y de la cola bastante nuevas; coberteras primarias sin punta clara.

MUDA

Muda **postnupcial** completa comenzada en mayo-junio para detenerse antes de la migración y terminar en las áreas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial reducida a plumas corporales, escapulares y pequeñas y medianas coberteras alares; algunos ejemplares la extienden a la mayor parte o todas las coberteras del ala; comenzada habitualmente en octubre y terminada en las zonas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Cernícalo primilla. Adulto. Hembra (07-VI).

03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



Cernícalo primilla. 2º año. Macho (12-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Macho con aspecto de hembra (11-VII).



Cernícalo primilla. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-VI); abajo hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Hembra (10-V).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (12-V); centro macho con aspecto de hembra (11-VII); abajo hembra (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Macho (26-VI).



03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (12-V); arriba derecha macho con aspecto de hembra (11-VII); izquierda hembra (10-V).

03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)




Cernícalo primilla. Adulto. Diseño del obispillo y supracoberteras de la cola: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (12-V); arriba derecha macho con aspecto de hembra (11-VII); izquierda hembra (10-V).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño del obispillo y supracoberteras de la cola: izquierda macho (12-V); derecha hembra (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño del obispillo y supracoberteras de la cola: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).

Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (16-VI); abajo hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño del flanco: arriba macho (12-V); abajo hembra (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (26-VI); abajo hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VI); derecha hembra (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (12-V); arriba derecha macho con aspecto de hembra (11-VII); izquierda hembra (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (26-VI); derecha hembra (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (16-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (12-V).



Cernícalo primilla. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (26-VI).



Cernícalo primilla. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras primarias (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Macho: diseño de primarias (16-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Hembra: diseño de primarias (07-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Macho: diseño de primarias (12-V).



Cernícalo primilla. 2º año. Hembra: diseño de primarias (10-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Macho: diseño de primarias (26-VI).



Cernícalo primilla. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (26-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Macho: diseño de secundarias (16-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (10-V).




Cernícalo primilla. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (07-VI).



Cernícalo primilla. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (26-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Macho: diseño de secundarias (12-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (26-VI).

03030 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



Cernícalo primilla. Adulto. Macho: diseño del ala (10-V).



Cernícalo primilla. 2º año. Hembra: diseño del ala (12-VI).



Cernícalo primilla. Adulto. Hembra: diseño del ala (07-VI).



Cernícalo primilla. Juvenil. Macho: diseño del ala (26-VI).



Cernícalo primilla. 2º año. Macho: diseño del ala (12-V).



Cernícalo primilla. Juvenil. Hembra: diseño del ala (26-VI).