

# 03040 Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)





Cernícalo vulgar. Adulto. Macho (24-XI).



Cernícalo vulgar. Macho: diseño del ala, cabeza y dorso.

## IDENTIFICACIÓN


31-38 cm. Alas puntiagudas y cola larga, con banda negra cerca del final; uñas oscuras; dorso pardo, moteado en ambos sexos; partes inferiores ocre claro; cabeza y cola gris y sin estrías en el **macho**, más ocre y estriadas en **hembra** y **juveniles**; la primaria más externa es similar en longitud a la séptima.



Cernícalo vulgar. Hembra: fórmula alar y color de las uñas

## ESPECIES SIMILARES

Puede recordar a un **gavilán**, que tiene dorso gris y ojos amarillos o anaranjados. El dorso ocre punteado lo separa del resto de las pequeñas rapaces, excepto de la **hembra del cernícalo primilla**, que tiene las uñas claras y la primaria más externa es más larga que la séptima; los **machos de cernícalo primilla** no tienen el dorso punteado y presentan una franja azulada en las alas.



Gavilán



Cernícalo primilla. Macho: diseño del ala, cabeza y dorso.



Cernícalo primilla. Hembra: fórmula alar y color de las uñas

## SEXO

**Macho adulto** con cabeza gris, con ligero rayado oscuro; plumas del dorso con una marca subterminal oscura; plumas de la cola grises, generalmente sin barrado; supracoberteras caudales y obispillo uniformemente grises, sin barrado; pequeñas coberteras alares con moteado oscuro disperso. **Hembra adulta** con cabeza marrón, rayada de negro; cola, supracoberteras caudales y obispillo barrados y habitualmente, pero no siempre, con tinte grisáceo; moteado del dorso y supracoberteras alares denso, marrón oscuro y con forma triangular. **CAUIDADO:** el plumaje de las **hembras adultas** es muy variable y puede tener desde el diseño de un **juvenil** al de un **macho**, con obispillo, cola y cabeza grises. Los **juveniles** se pueden sexar sólo en los casos extremos: **macho** con supracoberteras caudales con tinte gris; **hembra** con supracoberteras caudales sin tinte gris (**CAUIDADO:** hay mucha variabilidad entre familias diferentes pudiéndose encontrar **machos** sin gris y **hembras** con gris; se recomienda sexar sólo si puede compararse entre hermanos). Después de su muda **postjuvenil** ambos sexos pueden reconocerse por el diseño del dorso y obispillo.



Cernícalo vulgar. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.





Cernícalo vulgar. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Cernícalo vulgar. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de pequeñas coberteras: arriba macho; abajo hembra.



Cernícalo vulgar. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cola y obispillo: izquierda macho; derecha hembra.



Cernícalo vulgar. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de la cola y supracoberteras caudales: izquierda macho; derecha hembra.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** parecidos a la **hembra** pero con plumaje muy nuevo y sin límites de muda en cola y en plumas de vuelo; coberteras primarias con punta clara formando una línea; secundarias con punta clara ancha; banda subterminal negra en las rectrices externas con forma de media luna.

**1º año invierno/2º año primavera** con contraste entre las plumas nuevas de **adulto** y las **juveniles** desgastadas en dorso y coberteras alares; coberteras primarias y secundarias **juveniles** con amplia punta clara; rectrices externas **juveniles** con banda subterminal negra con forma de media luna; en **machos**, obispillo con fuerte contraste entre las plumas azuladas de **adulto** mudadas y las **juveniles** retenidas de color leonado.

**Adulto** sin plumas **juveniles** en el cuerpo y alas; coberteras primarias sin punta clara; secundarias con punta clara estrecha; plumas de la cola grises y sin barrado en **macho** y de color leonado, con más o menos tinte gris, en **hembra**; en **hembras** banda subterminal negra en las rectrices externas con forma cuadrada.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial limitada a plumas corporales, escapulares y, en ocasiones, las pequeñas y medianas coberteras alares; normalmente terminada en noviembre.

**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Cernícalo vulgar. Adulto. Hembra (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Macho (29-XII).



Cernícalo vulgar. 1º año. Hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Macho (07-VII).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (24-XI); derecha hembra (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño de la cabeza: izquierda macho (07-VII); derecha hembra (07-VII).

**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (24-XI); derecha hembra (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (07-VII); derecha hembra (07-VII).




Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (24-XI); derecha hembra (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (07-VII); derecha hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (24-XI); abajo hembra (13-I).



**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño del flanco: arriba macho (29-XII); abajo hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño del obispillo y supracoberteras caudales: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (07-VII); abajo hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño del obispillo y supracoberteras caudales: izquierda macho (07-VII); derecha hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño del obispillo y supracoberteras caudales: arriba izquierda macho (24-XI); arriba derecha (13-I) e izquierda hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (24-XI); arriba derecha (13-I) e izquierda hembra (27-IX).


**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)




Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (07-VII); derecha hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (24-XI); abajo hembra (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (29-XII); abajo hembra (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (07-VII); abajo hembra (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Macho: diseño de primarias (24-XI).

**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)



Cernícalo vulgar. Adulto. Hembra: diseño de primarias (13-I).



Cernícalo vulgar. 1º año. Macho: diseño de primarias (29-XII).



Cernícalo vulgar. 1º año. Hembra: diseño de primarias (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Macho: diseño de primarias (07-VII).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Hembra: diseño de primarias (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Macho: diseño de coberturas y secundarias (24-XI).



Cernícalo vulgar. Adulto. Hembra: diseño de coberturas y secundarias (13-I).



**03040 Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*)



Cernícalo vulgar. 1º año. Macho: diseño de coberteras y secundarias (29-XII).



Cernícalo vulgar. 1º año. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Macho: diseño de secundarias (07-VII).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Hembra: diseño de secundarias (07-VII).



Cernícalo vulgar. Adulto. Macho: diseño del ala (26-III).



Cernícalo vulgar. Adulto. Hembra: diseño del ala (12-VI).



Cernícalo vulgar. 1º año. Macho: diseño del ala (29-XII).



Cernícalo vulgar. 1º año. Hembra: diseño del ala (27-IX).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Macho: diseño del ala (07-VII).



Cernícalo vulgar. Juvenil: Hembra: diseño del ala (07-VII).