





Alcotán. Adulto. Macho (18-VI).

IDENTIFICACIÓN

30-35 cm. **Adulto** con dorso de color pizarra; partes inferiores claras; bigotera oscura; plumas de las calzas y bajo vientre de color rojizo; cola gris; alas claras por debajo. **Juveniles** pardos y estriados, sin color rojizo en las partes inferiores.



Alcotán. Adulto: diseño del pecho, calzas y dorso.



Alcotán. Juvenil: diseño del pecho, calzas y dorso.

ESPECIES SIMILARES

El **adulto** puede separarse de los demás halcones pequeños por su bigotera y partes inferiores rojizas; el **juvenil** recuerda a un **halcón peregrino** (38-45 cm) que es mayor y con dorso más pardo.



Halcón peregrino. Juvenil.

SEXO



El tamaño permite sexar a los **machos** más pequeños, con una ala menor de 245 mm. (**CAUTION:** ejemplares con alas más largas pueden ser de ambos sexos). En **adultos**, el **macho** generalmente tiende a tener dorso azul-gris intenso; calzas e infracoberteras de la cola sin moteado o poco marcado; partes inferiores rojo intenso. La **hembra** generalmente tiende a tener dorso azul-gris apagado, calzas e infracoberteras de la cola moteadas, partes inferiores con rojo más apagado (**CAUTION:** sexado a veces difícil debido al solapamiento). En **juveniles**, el **macho** generalmente con marcas en las infracoberteras de la cola pequeñas y poco abundantes; el color ocre de las partes inferiores con un ligero tinte naranja; en las plumas 3^a-5^a de la cola la banda clara próxima a la banda subterminal generalmente interrumpida en el raquis por una línea oscura estrecha. **Hembra** generalmente con marcas en las infracoberteras de la cola grandes y abundantes; el color ocre de las partes inferiores sin tinte naranja; en las plumas 3^a-5^a de la cola la banda clara próxima a la banda subterminal generalmente interrumpida en el raquis por una línea oscura ancha. El diseño de las plumas 3^a a 5^a de la cola sirve para sexar las aves de **2º año** siempre que mantengan las rectrices **juveniles** sin cambiar. (**CAUTION:** el sexado de **juveniles** y aves de **2º año** no siempre es posible debido al solapamiento de algunos caracteres, debiéndose asignar el sexo sólo en ejemplares extremos y cuando se cumplan todos los requisitos descritos).



Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho; derecha hembra.



Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de las calzas: izquierda macho; derecha hembra.



Alcotán. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho; derecha hembra.



Alcotán. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de la banda clara junto a la mancha oscura subterminal en la 3ª pluma de la cola: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:


Juvenil con plumas del ala y partes superiores negro-marrón orladas de ante; infracoberteras de la cola y calzas de color ante claro; par central de plumas de la cola con punta ante, el resto de las plumas de la cola barreadas y con punta ante; grandes coberteras y coberteras primarias con borde ante; y cera y anillo ocular gris-azulado.

2º año con plumaje similar al **adulto** o con plumas **juveniles** marrones mezcladas; cola habitualmente con mezcla de plumas **juveniles** y de tipo **adulto**; grandes coberteras y plumas de vuelo **juveniles** (en verano a veces con algunas plumas de **adulto** recién mudadas).

Adulto con plumas de la partes superiores gris-azuladas; infracoberteras de la cola y calzas de color rojizo; par central de plumas de la cola sin punta ante; plumas de la cola con punta grisácea; grandes coberteras y coberteras primarias sin borde ante; cera y anillo ocular amarillos. **CUIDADO:** algunos ejemplares **adultos** pueden retener secundarias con patrón de **adulto** pero nunca tendrán coberteras del ala **juveniles**.



Alcotán. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de las calzas: izquierda adulto; derecha juvenil.



Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las zonas de cría, suspendida durante la migración y terminada en sus áreas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial en invierno, cambiando parte de las plumas corporales y, a veces, algunas de la cola y algunas coberteras del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Alcotán. Adulto. Hembra (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Macho (30-IV).



Alcotán. 2º año. Hembra (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Macho ().



Alcotán. Juvenil. Hembra (29-XI).




Alcotán. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-VI); abajo hembra (06-VIII).




03100 Alcotán europeo (*Falco subbuteo*)



Alcotán. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-IV); abajo hembra (19-IX).



Alcotán. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (); derecha hembra (29-XI).




Alcotán. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (29-XI).



Alcotán. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).



Alcotán. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).

03100 Alcotán europeo (*Falco subbuteo*)

FOTO NO
DISPONIBLE



Alcotán. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (29-XI).


FOTO NO
DISPONIBLE



Alcotán. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (29-XI).



Alcotán. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. Adulto. Diseño de las calzas: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-IV); derecha hembra en otoño (19-IX).



Alcotán. 2º año. Diseño de las calzas: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Diseño de las calzas: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (15-X).



Alcotán. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (29-XI).



Alcotán. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Diseño del obispillo: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).




Alcotán. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).




Alcotán. Juvenil. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (15-X).



Alcotán. Adulto. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la cola: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la cola: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la cola: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (15-X).



Alcotán. Adulto. Macho: diseño de las coberteras primarias (18-VI).



Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras primarias (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Macho: diseño de las coberteras primarias (30-IV).



Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de las coberteras primarias (29-XI).



Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras primarias (19-IX).



Alcotán. Adulto. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII).



Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de las coberteras primarias (10-IX).



Alcotán. 2º año. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (29-XI).



Alcotán. Adulto. Macho: diseño de primarias (18-VI).



Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de primarias (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Macho: diseño de primarias (30-IV).



Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de primarias (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de primarias (10-IX).



Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (29-XI).



Alcotán. Adulto. Macho: diseño de secundarias con plumas retenidas (18-VI).



Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (06-VIII).



Alcotán. 2º año. Macho: diseño de secundarias (30-IV).



Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (19-IX).



Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (10-IX).



Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (29-XI).



Alcotán. 2º año. Macho: diseño del ala (30-IV).



Alcotán. Adulto. Macho: diseño del ala (18-VI).



Alcotán. 2º año. Hembra: diseño del ala (19-IX).



Alcotán. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-VIII).



Alcotán. Juvenil. Macho: diseño del ala (10-IX).





Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño del ala (29-XI).