

IDENTIFICACIÓN

35-39 cm. En plumaje **nupcial macho** con cabeza, pecho y partes superiores barreadas de pardo negruzco con fondo claro; partes inferiores blancas; plumas de vuelo blancas; carúnculas rojas. **Hembra** con plumaje pardo negruzco y pardo claro; partes inferiores blancas; carúncula pequeña y roja. En **invierno**, ambos sexos similares, de color blanco y cola oscura.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juveniles con capirote y cuello gris negruzco, moteado y estriado de amarillo claro; pecho y flancos barreados de gris y amarillo; partes inferiores gris claro; primarias marrón claro, moteadas de blanco sucio en las barbas externas; las dos primarias más externas blancas, con raquis oscuro; secundarias externas marrón claro; secundarias internas y coberteras del ala barreadas de negro y ocre.

1º año otoño con aspecto similar a la **hembra** en **otoño**, pero con algunas plumas corporales **juveniles** retenidas; las dos primarias más externas **juveniles** retenidas son más oscuras que el resto ya mudado.

1º año/2º año invierno similar al **adulto**, pero con las dos primarias más externas **juveniles** retenidas más desgastadas y oscuras que las demás ya mudadas.

Adulto con plumas corporales como las descritas en **SEXO**; partes inferiores blancas; plumas de vuelo blancas, excepto las secundarias más internas; primarias sin límite de muda.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Esta especie tiene tres tipos diferentes de plumaje:

En **plumaje nupcial** (Mayo-Julio), **macho** con capirote marrón oscuro, barreado de castaño; lados del cuello con barreado ancho de color marrón negro; dorso, secundarias internas y coberteras alares internas gris marrón oscuro; con una línea negra entre el ojo y el pico; carúncula de color bermellón a escarlata intenso. **Hembra** con capirote negro, moteado de amarillo; lados del cuello gris oscuro marrón, muy moteados de amarillo; dorso, secundarias internas y coberteras alares internas negras, barreadas de amarillo claro; sin una línea negra entre el ojo y el pico; carúncula de color naranja a bermellón.

En **plumaje no nupcial** (julio-octubre), **macho** con partes superiores oliva o gris, finamente vermiculados de marrón negro; línea entre el ojo y el pico marrón oscuro, a veces moteada de blanco; plumas nupciales retenidas con diseño de **macho**. **Hembra** con partes superiores con diseño muy tosco, a menudo con moteado blanco; línea entre el ojo y el pico amarillo ante; plumas nupciales retenidas con diseño de **hembra**.

En **plumaje de invierno** (noviembre-mazo) ambos sexos con plumaje blanco similar, pero el **macho** con una estría negra detrás del ojo, que está ausente o es muy pequeña en la **hembra**.

El tamaño puede ser de ayuda durante todo el año en ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 198 mm; **hembra** con ala menor de 196 mm: Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** casi completa en otoño cambiando las plumas de vuelo y cola pero sólo parte de las plumas corporales; generalmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial, incluyendo parte de las plumas corporales y las plumas de vuelo, excepto las dos primarias más externas que permanecen retenidas. Ambos tipos de edad tienen otra muda en invierno, hasta diciembre, donde adquieren el plumaje blanco y una muda **prenupcial** en primavera, mayo-junio, que incluye las plumas corporales excepto las de la parte inferior del pecho y el vientre.

03300 Lagópodo alpino (*Lagopus muta*)

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso