



Perdiz pardilla. Adulto Macho (21-II).

IDENTIFICACIÓN

28-30 cm. Dorso gris, moteado de blanco y pardo; cara de color castaño; flanco gris, con abundante barrado transversal; pecho gris con una amplia mancha en forma de herradura en el **macho**, pequeña o sin mancha en la **hembra**.



Perdiz pardilla. Adulto: diseño de cabeza y dorso.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Macho con cara naranja intenso; abdomen con una mancha ancha y oscura con forma de herradura; escapulares y coberteras medianas a menudo con marcas amplias y color leonado en la barba interna. **Hembra** con cara naranja apagado; abdomen con la mancha parda en herradura pequeña o ausente; escapulares y coberteras medianas marrón oscuro, sin castaño, con barrado ante bien marcado, bordeadas de negro. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Perdiz pardilla. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de las partes inferiores: izquierda macho; derecha hembra.



Perdiz pardilla. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del flanco: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden determinarse 3 tipos de edad :

Juvenil sin cara anaranjada; partes inferiores pardo amarillentas rayadas de claro; flanco con rayado claro; pico oscuro.

1º año otoño/2º año primavera similar al **adulto**, pero con límite de muda entre las 2 primarias externas y sus coberteras primarias **juveniles** no mudadas, más desgastadas y ocres que las plumas vecinas.

Adulto con cara anaranjada; partes inferiores grises; flanco con barrado castaño; pico claro; todas las primarias y coberteras primarias de la misma generación, sin límites de muda.

03670 Perdiz pardilla (*Perdix perdix*)



Perdiz pardilla. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto; abajo juvenil.



Perdiz pardilla. Determinación de la edad. Diseño de las partes inferiores: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Perdiz pardilla. Determinación de la edad. Diseño del flanco: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando todas las plumas excepto las dos primarias más externas y sus coberteras primarias, que son retenidas. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** reducida solo a plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
 ■ Invernante ■ En paso



Perdiz pardilla. Hembra (21-II).



Perdiz pardilla. 2º año. Macho (21-II).

03670 Perdiz pardilla (*Perdix perdix*)



Perdiz pardilla. 2º año. Hembra (21-II).



Perdiz pardilla. Juvenil (25-VII).



Perdiz pardilla. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (21-II); abajo hembra (21-II).



Perdiz pardilla. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (21-II); centro 2º año hembra (21-II); abajo juvenil (25-VII)



Perdiz pardilla. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (21-II); derecha hembra (21-II).

03670 Perdiz pardilla (*Perdix perdix*)



Perdiz pardilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (21-II); derecha hembra (21-II).



Perdiz pardilla. Diseño del píleo: arriba izquierda 2º año macho (21-II); arriba derecha 2º año hembra (21-II); izquierda juvenil (25-VII)



Perdiz pardilla. Adulto. Macho: diseño del flanco (21-II)



Perdiz pardilla. Adulto. Hembra: diseño del flanco (21-II)



Perdiz pardilla. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (21-II); arriba derecha 2º año hembra (21-II); izquierda juvenil (25-VII)



Perdiz pardilla. 2º año. Macho: diseño del flanco (21-II)

03670 Perdiz pardilla (*Perdix perdix*)



Perdiz pardilla. 2º año. Hembra: diseño del flanco (21-II)



Perdiz pardilla. Juvenil: diseño del flanco (25-VII)



Perdiz pardilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (21-II); derecha hembra (21-II).



Perdiz pardilla. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (21-II); derecha hembra (22-II)



Perdiz pardilla. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (21-II); arriba derecha 2º año hembra (21-II); izquierda juvenil (25-VII)



Perdiz pardilla. Diseño de la cola: izquierda 2º año macho (21-II); derecha 1º año hembra (28-VIII)



Perdiz pardilla. Adulto. Macho: diseño de coberteras y secundarias (21-II)



Perdiz pardilla. 2º año. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (21-II)



Perdiz pardilla. Adulto. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (21-II)



Perdiz pardilla. Juvenil: diseño de coberteras y secundarias (25-VII)



Perdiz pardilla. 2º año. Macho: diseño de coberteras y secundarias (25-VII)



Perdiz pardilla. Adulto. Macho: diseño de primarias (21-II)



Perdiz pardilla. Adulto. Hembra: diseño de primarias (21-II)



Perdiz pardilla. Juvenil: diseño de primarias (25-VII).



Perdiz pardilla. 2º año. Macho: diseño de primarias (25-VII)



Perdiz pardilla. Adulto. Macho: diseño del ala (21-II)



Perdiz pardilla. Adulto. Hembra: diseño del ala (21-II)



Perdiz pardilla. 1º año. Hembra: diseño de primarias (07-IX) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Perdiz pardilla. 2º año. Macho: diseño del ala (25-VII)



Perdiz pardilla. 1º año. Hembra: diseño del ala (07-IX) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Perdiz pardilla. Juvenil: diseño del ala (25-VII) (Foto (ligeramente modificada): Ralph Lösekrug).

Las fotografías se han realizado con la colaboración del Centre de Fauna d'Esterrí d'Àneu (Generalitat de Catalunya).