



Correlimos menudo. Otoño. Adulto (22-VIII).

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Patas de color negro, pico recto y corto. En plumaje nupcial partes superiores pardo oscuro, con pintas castaño; alas pardas con banda blanca; partes inferiores blancas, con pecho manchado de ocre; alas pardas con banda blanca; ceja clara. En plumaje de **invierno** partes superiores pardo gris uniforme; partes inferiores blancas, con pecho gris.



Correlimos menudo. Otoño.

ESPECIES SIMILARES

Puede recordar a un **correlimos común**, que tiene el pico más largo y curvado y es de mayor tamaño (17-18 cm.)



Correlimos común



SEXO

Ambos sexos con plumaje similar. El tamaño puede ayudar en casos extremos: **macho** con ala menor de 95 mm, pico menor de 17 mm; **hembra** con ala mayor de 99 mm, pico mayor de 19 mm.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que se reconocen solo 3 tipos de edad:

1º año otoño con plumaje nuevo; dorso marrón negro, con bordes castaños y blancos formando diseños en "V"; medianas coberteras marrones, con borde castaño apagado en las externas y castaño intenso en las internas; punta de coberteras primarias internas con borde blanco ancho; partes inferiores blancas con moteado en el pecho poco marcado; plumas del obispillo sin borde castaño.

2º año primavera con plumaje similar al del **adulto**, pero reconocible por retener algunas pequeñas y medianas coberteras con borde castaño; los ejemplares que retienen primarias o secundarias muestran límite de muda en la plumas de vuelo.

Adulto en otoño con plumaje ligeramente desgastado; dorso con las plumas nuevas gris marrón, con listado oscuro; medianas coberteras mudadas gris marrón; punta de coberteras primarias internas sin o con borde blanco delgado; partes inferiores blancas con moteado bien marcado en el pecho; plumas del obispillo con borde castaño. En **primavera** con dorso marrón negro con bordes castaño brillante; coberteras marrones con bordes más claros y punta clara; partes inferiores blancas con moteado en el pecho bien marcado; plumas del obispillo con borde castaño.



Correlimos menudo. Primavera. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha 2º año.



Correlimos menudo. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año.



Correlimos menudo. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año.



Correlimos menudo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las zonas de reproducción con plumas corporales, suspendida durante la migración y terminada en las áreas de invernada. Muda **postjuvenil** habitualmente completa pero interrumpida en algunos ejemplares que pueden retener algunas plumas de vuelo. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial que abarca plumas corporales, escapulares, pequeñas y medianas coberteras, terciarias y habitualmente plumas centrales de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Correlimos menudo. Otoño. 1º año (22-VIII).


05010 Correlimos menudo (*Calidris minuta*)




Correlimos menudo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (22-VIII); abajo 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (22-VIII); abajo 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño del píleo: izquierda adulto (22-VIII); derecha 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño del flanco: arriba adulto (22-VIII); abajo 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño del píleo: izquierda adulto (22-VIII); derecha 1º año (22-VIII)

05010 Correlimos menudo (*Calidris minuta*)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (22-VIII); derecha 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (22-VIII).




Correlimos menudo. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (22-VIII); abajo 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (22-VIII); derecha 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (22-VIII); derecha 1º año (22-VIII)



Correlimos menudo. Otoño. Adulto: diseño de primarias (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. 1º año: diseño de primarias (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. Adulto: diseño del ala (22-VIII).



Correlimos menudo. Otoño. 1º año: diseño del ala (22-VIII).