



Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto (23-V)

IDENTIFICACIÓN


18-19 cm. En plumaje **nupcial** con dorso pardo oscuro y partes inferiores rojizas; en **invierno** con dorso gris y vientre blanco; cabeza con ceja clara; ala con una banda blanca; pico largo y curvado; patas oscuras.



Correlimos zarapitín. Diseño de pico, obispillo, ala y patas.

ESPECIES SIMILARES

En plumaje **nupcial** inconfundible debido al color rojizo de la cabeza y partes inferiores. En plumaje **no nupcial** recuerda un **correlimos común**, que tiene el pico más corto y una línea parda en el obispillo.



Correlimos común. Otoño

<http://blascozumeta.com>

SEXO

En plumaje de **eclipse** el diseño de ambos sexos es similar. En plumaje **nupcial** el brillo e intensidad del color castaño es altamente variable en ambos sexos por lo que no es una característica útil para la determinación del sexo. Igualmente las medidas biométricas muestran solapamiento.

EDAD

Desde que habitualmente las aves de **2º año** permanecen en sus zonas de invernada, en Aragón solo pueden reconocerse 2 clases de edad:

1º año otoño con plumaje muy nuevo; pequeñas y medianas coberteras de color gris claro con el raquis oscuro y un borde redondeado ancho de ante a blanquecino; plumas del dorso gris apagado con un borde subterminal más oscuro y punta blanca; plumas de vuelo con una sola generación.

Adulto en ambos pasos migratorios de **primavera** y **otoño** con plumas de color castaño en cabeza y pecho; coberteras del ala con una mezcla de plumas grises de eclipse y plumas nupciales de color negro y castaño; en **otoño** con todas las plumas de vuelo desgastadas si están sin mudar o con mezcla de plumas viejas no mudadas y nuevas cambiadas; plumas mudadas del dorso de color gris marrón con el raquis más oscuro.



Correlimos zarapitín. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del pecho: arriba adulto; abajo 1º año.



<http://www.aranzadi.eus>

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos zarapitín. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año.



Correlimos zarapitín. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto (foto: Ottenby Bird Observatory); abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las zonas de reproducción y terminada en las áreas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial similar al **adulto**, si bien generalmente no comienza, o es muy escasa, antes de llegar a los cuarteles de invernada; pueden dejar retenidas algunas plumas de vuelo **juveniles**. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial que incluye plumas corporales, la mayor parte de las escapulares, algunas terciarias, algunas plumas de la cola y a veces algunas coberteras del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Correlimos zarapitín. Otoño Adulto ()



Correlimos zarapitín. Otoño 1º año (14-IX)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos zarapitín. Diseño de la nuca: arriba izquierda adulto en primavera (23-V); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año (14-IX).



**FOTO NO
DISPONIBLE**




Correlimos zarapitín. Diseño del pecho: arriba adulto en primavera (23-V); centro adulto en otoño (); abajo 1º año (14-IX).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Correlimos zarapitín. Diseño del flanco: arriba adulto en primavera (23-V); centro adulto en otoño (); abajo 1º año (14-IX).





**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto: diseño de coberteras del ala (23-V)



Correlimos zarapitín. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto en primavera (23-V); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año (14-IX).



Correlimos zarapitín. Otoño. Adulto: diseño de coberteras del ala (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



**FOTO NO
DISPONIBLE**



Correlimos zarapitín. Otoño. 1º año: diseño de coberteras del ala (14-IX)



Correlimos zarapitín. Diseño de la cola y obispillo: arriba izquierda adulto en primavera (23-V); arriba derecha adulto en otoño (); izquierda 1º año (14-IX).




Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto: diseño de coberteras primarias (23-V)



Correlimos zarapitín. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Correlimos zarapitín. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (14-IX)



Correlimos zarapitín. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto en primavera (23-V); arriba derecha adulto en otoño (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory); izquierda 1º año (14-IX).



Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (23-V)



Correlimos zarapitín. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Correlimos zarapitín. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (14-IX)



Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto: diseño de primarias (23-V)



Correlimos zarapitín. Otoño. Adulto: diseño de primarias (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Correlimos zarapitín. Otoño. 1º año: diseño de primarias (14-IX)



Correlimos zarapitín. Primavera. Adulto: diseño del ala (23-V)



Correlimos zarapitín. Otoño. Adulto: diseño del ala (16-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory)



Correlimos zarapitín. Otoño. 1º año: diseño del ala (14-IX)