


05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)



Archibebe común. Primavera. Adulto (02-V).

IDENTIFICACIÓN

27-28 cm. En **primavera** con partes superiores pardo claro, barreadas; obispillo blanco; cola blanca, barrada de oscuro; alas con una amplia banda blanca; partes inferiores blancas, rayadas de pardo en cabeza, cuello y pecho; pico rojo con punta negra y patas rojo-anaranjadas. En **otoño** de colores más grises por encima; partes inferiores con tinte gris en el pecho.



Archibebe común. Diseño del ala, cola y pico.

ESPECIES SIMILARES

Parecido a un **archibebe oscuro** en **otoño**, que no tiene mancha blanca en el ala y tiene el pico más largo; el **combatiente** tiene la barra alar más estrecha y dos bandas blancas a ambos lados de la cola.



Archibebe oscuro. Otoño.



Combatiente.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Esta especie es un **reproductor** escaso en Aragón, por lo que pueden reconocerse solo 3 tipos de edad:

1º año otoño con plumaje nuevo; coberteras medianas moteadas de claro en el borde; terciarias marrones con manchas oscuras y ante; plumas de la cola puntiagudas; pecho ligeramente listado; base del pico rojo apagado; patas amarillentas.

2º año primavera similar al adulto; esta edad puede reconocerse solo en los ejemplares que han conservado sin mudar algunas medianas coberteras del ala y/o terciarias; plumas de vuelo moderadamente desgastadas.

Adulto con coberteras medianas con borde blanco y banda subterminal oscura; terciarias gris marrón con diseño variable: lisas o con barras de color sepia oscuro, a veces con amplias manchas oscuras; plumas de la cola redondeadas; partes inferiores con variable cantidad de moteado y barrado; patas y base del pico rojizos.



Archibebe común. Determinación de la edad. Diseño del pico: arriba adulto; abajo 1º año.



Archibebe común. Determinación de la edad. Diseño de las patas: arriba adulto; abajo 1º año.



Archibebe común. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto en primavera; derecha 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando en las áreas de reproducción y terminada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando plumas corporales, la mayor parte de las escapulares, algunas plumas de la cola (ocasionalmente todas), algunas terciarias y algunas pequeñas y medianas coberteras del ala; comenzada en las áreas de reproducción y terminada en las zonas de invernada. Ambas clases de edad tienen una muda **pre-nupcial** que abarca todas o parte de las plumas corporales, algunas escapulares, terciarias, coberteras del ala y a veces algunas plumas de la cola.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Residente

■ Invernante

■ En paso



Archibebe común. Primavera. 2º año (04-V).



Archibebe común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (02-V); abajo 2º año (04-V).



05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)



Archibebe común. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (02-V); abajo 2º año (04-V).



Archibebe común. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (02-V); derecha 2º año (04-V).



Archibebe común. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (02-V); derecha 2º año (04-V).



Archibebe común. Primavera. Adulto: diseño y desgaste de coberteras del ala (02-V).



Archibebe común. Primavera. 2º año: diseño y desgaste de coberteras del ala (04-V).

05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)



Archibebe común. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (02-V); derecha 2º año (04-V).



Archibebe común. Primavera. Adulto: diseño de primarias (02-V).



Archibebe común. Primavera. 2º año: diseño de primarias (04-V).



Archibebe común. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (02-V).



Archibebe común. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (04-V).



Archibebe común. Primavera. Adulto: diseño del ala (02-V).

05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)



Archibebe común. Primavera. 2º año: diseño del ala (04-V).



Archibebe común. Otoño. Adulto (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Archibebe común. Otoño. 1º año (04-IX).



Archibebe común. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory); abajo 1º año (04-IX).



Archibebe común. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); abajo 1º año (04-IX).



Archibebe común. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 1º año (04-IX).

05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe común. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto (); abajo 1º año (04-IX).




Archibebe común. Otoño. Adulto: diseño de coberturas del ala (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Archibebe común. Otoño. 1º año: diseño de coberturas del ala (04-IX).



Archibebe común. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 1º año (04-IX).



Archibebe común. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory); derecha 1º año (04-IX).

05460 Archibebe común (*Tringa totanus*)



Archibebe común. Otoño. Adulto: diseño de primarias (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Archibebe común. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (04-IX).



Archibebe común. Otoño. 1º año: diseño de primarias (04-IX).




**FOTO NO
DISPONIBLE**

Archibebe común. Otoño. Adulto: diseño del ala (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Archibebe común. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (07-VII) (Foto: Ottenby Bird Observatory).



Archibebe común. Otoño. 1º año: diseño del ala (04-IX).