



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Macho (17-VII).

IDENTIFICACIÓN

30-32 cm. En plumaje **nupcial**, **macho** con dorso moteado de amarillo; obispillo barrado de negro y amarillo; cabeza amarillenta, garganta negra; banda pectoral castaña orlada de negro. **Hembra** amarillenta por encima, listada transversalmente de negro, ocre y gris; garganta clara. Ambos sexos tienen el abdomen blanco.

ESPECIES SIMILARES

De aspecto parecido a la **ganga ortega**, que tiene las partes inferiores negras.



Foto: José Antonio Pinzolas

SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con pecho y lateral de la cabeza de color ocre intenso; mentón negro; dorso gris verdoso con manchas amarillas; pecho con una banda oscura; secundarias internas sin barrado; grandes coberteras de color marrón y gris con líneas amarillas y negras. **Hembra** con pecho y lateral de la cabeza de color ocre claro; mentón blanco; dorso barrado de amarillo, gris y negro; pecho con dos bandas oscuras; secundarias más internas con barrado; grandes coberteras de color amarillo y gris con líneas oscuras. En plumaje de **eclipse**, **macho** parecido a la **hembra**, pero con diferente diseño en las coberteras del ala. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje hasta que comienzan a mudar las coberteras del ala en **otoño**.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con una banda clara detrás del ojo; plumas del dorso y coberteras del ala con borde crema y una línea marrón en forma de "V"; plumas centrales de la cola cortas; coberteras primarias con punta clara.

1º año otoño/2º año primavera de aspecto similar al adulto, pero con las tres primarias más externas y sus coberteras **juveniles** no mudadas; las primarias retenidas más decoloradas y puntiagudas que el resto; coberteras primarias retenidas con punta clara.

Adulto sin una banda clara detrás del ojo; plumas del dorso y coberteras del ala sin línea marrón en forma de "V"; plumas centrales de la cola muy largas; coberteras primarias sin punta clara.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre, adquiriendo el plumaje de **eclipse**. Muda **postjuvenil** bastante completa, incluyendo todas las plumas excepto las tres primarias más externas y sus coberteras primarias. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, entre noviembre y marzo, que incluye plumas corporales para adquirir el plumaje **nupcial**.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Hembra (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Ganga ibérica. Verano. 2º año. Macho (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Hembra (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Juvenil (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (17-VII); abajo hembra (17-VII).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Ganga ibérica. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (17-VII); abajo juvenil (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño del mentón: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).

06620 Ganga ibérica (*Pterocles alchata*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Diseño del mentón: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Diseño de la nuca: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Diseño del píleo: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).

06620 Ganga ibérica (*Pterocles alchata*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Ganga ibérica. Verano. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias ().



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Juvenil: diseño de coberteras primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda macho (17-VII); derecha hembra (17-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Ganga ibérica. Verano. Diseño de escapulares y terciarias: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (17-VII); izquierda juvenil (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Macho: diseño de primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Hembra: diseño de primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Hembra: diseño de primarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Macho: diseño de primarias ().



Ganga ibérica. Verano. Juvenil: diseño de primarias (17-VII).





Ganga ibérica. Verano. Adulto. Macho: diseño de secundarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Macho: diseño de secundarias ().



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-VII).

Ganga ibérica. Verano. Juvenil: diseño de secundarias (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala ().



Ganga ibérica. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (17-VII).



Ganga ibérica. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (17-VII).



Ganga ibérica. Juvenil: diseño del ala (17-VII).