



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho (02-VI)

IDENTIFICACIÓN

30-33 cm. **Adultos** con coloración general gris azulada, sin blanco en el ala ni en el obispillo; ala con dos franjas negras cerca del borde posterior; cuello con tinte verdoso y púrpura; cola gris con dos barras terminales; patas rojas, pico rojo con amarillo en la punta. **Juveniles** pardos, sin reflejos metálicos en el cuello.



Paloma zurita. Diseño del obispillo, infracoberteras alares y ala.

ESPECIES SIMILARES

Puede haber confusión con la **paloma bravía/ doméstica**, que tiene obispillo blanco y es blanca por debajo del ala. La **paloma torcaz**, de mayor tamaño, tiene una franja blanca en el ala.



Paloma doméstica



Paloma torcaz

SEXO

Macho con manto, terciarias y escapulares de color gris azulado. **Hembra** con manto, terciarias y escapulares de color gris-marrón (**CAUTION:** con plumaje desgastado ambos sexos son difíciles de separar). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño del collar: arriba macho; abajo hembra.





Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Paloma zurita. Determinación del sexo. Diseño de escapulares: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil sin iridiscencia en el cuello; plumas del dorso, coberteras del ala y terciarias de color marrón; coberteras primarias marrón claro; patas rosadas.

1º año otoño reconocibles, hasta completar la muda, por las plumas de vuelo y cola solo ligeramente desgastadas.

1º año otoño/2º año primavera solo en ejemplares con muda interrumpida, que tienen coberteras primarias externas **juveniles** de color marrón claro.

Adulto con iridiscencia en el cuello; plumas del dorso, coberteras del ala y terciarias de color gris azulado; coberteras primarias gris-negro; patas rojizas. En **otoño** reconocibles, hasta completar la muda, por tener las plumas de vuelo y cola muy desgastadas. En **primavera**, los ejemplares con muda interrumpida se reconocen por tener todas las coberteras primarias de color gris-negro.



Paloma zurita. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y cuello: arriba adulto; abajo juvenil.




Paloma zurita. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



Paloma zurita. Determinación de la edad. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.





Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas no mudadas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de primarias no mudadas: arriba adulto; abajo 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de secundarias no mudadas: arriba adulto; abajo 1º año.



Paloma zurita. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, habitualmente terminadas en diciembre (más tarde en **juveniles** de nidadas tardías). Ambos tipos de edad, más frecuente en juveniles, pueden interrumpir la muda y dejar plumas de vuelo sin cambiar.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho (08-V).



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra ().



Paloma zurita. Primavera. Juvenil (26-VII)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-VI); abajo hembra (17-V).



06680 Paloma zurita (*Columba oenas*)




Paloma zurita. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (08-V); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (26-VII).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (08-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (08-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).

06680 Paloma zurita (*Columba oenas*)





Paloma zurita. Primavera. Color de las patas: arriba adulto (17-V); abajo juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (02-VI); derecha hembra (17-V).



Paloma zurita. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (08-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (26-VII).



Paloma zurita. Primavera. Diseño de terciarias: arriba izquierda 2º año macho (08-V); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (06-VI).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (02-VI).



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (17-V).



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (08-V).



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias ().



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de coberteras primarias (26-VII)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (02-VI)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (17-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (08-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ()



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de primarias (26-VII)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (02-VI)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (17-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (1: plumas juveniles) (08-V)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ()



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias (06-VI)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (02-VI)



Paloma zurita. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-V)



Paloma zurita. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (1: plumas juveniles) (08-V)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Paloma zurita. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala ()



Paloma zurita. Primavera. Juvenil: diseño del ala (06-VI)

06680 Paloma zurita (*Columba oenas*)



Paloma zurita. Otoño. Adulto (28-X)



Paloma zurita. Otoño. 1º año (28-X)



Paloma zurita. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (28-X); abajo 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Color de las patas: arriba adulto (28-X); abajo 1º año (28-X).





Paloma zurita. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (28-X); derecha 1º año (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de primarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (28-X).



Paloma zurita. Otoño. Adulto: diseño del ala (28-X).



Paloma zurita. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-X).