

# 08310 Martín pescador común (*Alcedo atthis*)



Martín pescador. Primavera. Adulto. Macho (17-IV).

## IDENTIFICACIÓN

15-17 cm. Color azulado por encima, castaño-anaranjado por debajo; garganta blanca, con mancha también blanca a ambos lados del cuello.



Martín pescador. Diseño de la cabeza y el pecho.

## ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

## SEXO

**Macho** con la parte inferior del pico toda negra, mostrando si acaso una ligera mancha anaranjada en la base. **Hembra** con una mancha anaranjada que ocupa hasta dos tercios de la parte inferior del pico, con la punta marrón oscuro o negra. **CAUTION:** los juveniles tienen todo el pico negro al modo de los machos, no siendo posible su sexado por este carácter.



Martín pescador. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pico: arriba macho; abajo hembra.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con las plumas naranjas del pecho con borde pardo o verdoso formando una banda oscura; patas oscuras; plumas de vuelo nuevas.

**1º año otoño/2º año primavera** con aspecto similar al adulto, pero con las plumas de vuelo ligeramente desgastadas en otoño y gastadas en primavera; si han mudado parte de la cola entonces con límite de muda entre las rectrices.

**Adulto** con el pecho uniformemente anaranjado; en primavera patas de color naranja intenso (**CAUTION:** después de la época de reproducción pueden mostrar el mismo tinte oscuro en las patas que las aves de 1º año); si han detenido la muda, con plumas de vuelo nuevas y desgastadas; si han completado la muda con plumas de vuelo muy nuevas en otoño y ligeramente desgastadas en primavera; cola con las plumas de una sola generación. **CAUTION:** el desgaste de las plumas de vuelo como carácter para determinar la edad es a menudo muy difícil de apreciar.



Martín pescador. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

**08310** **Martín pescador común** (*Alcedo atthis*) 



Martín pescador. Determinación de la edad. Diseño de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho (26-IV).

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en noviembre; puede dejar sin cambiar alguna pluma de vuelo. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye las plumas corporales, extendiéndose en algunos ejemplares a parte o toda la cola; habitualmente terminada en octubre si bien ejemplares nacidos tarde pueden tener plumaje **juvenil** hasta diciembre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra (20-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra (20-V).



Martín pescador. Primavera. Juvenil (22-V).


**08310** Martín pescador común (*Alcedo atthis*)



Martín pescador. Primavera. Adulto. Diseño del pico y plumas de la cabeza: arriba macho (17-IV); abajo hembra (20-V).



Martín pescador. Primavera. Diseño del pico y plumas de la cabeza: arriba 2º año macho (26-IV); centro 2º año hembra (20-IV); abajo juvenil (22-V).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (17-IV); derecha hembra (20-V).



Martín pescador. Primavera. Diseño del capirote: arriba 2º año macho (26-IV); centro 2º año hembra (20-IV); abajo juvenil (22-V).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (17-IV); derecha hembra (20-V).



Martín pescador. Primavera. Diseño del pecho: arriba 2º año macho (26-IV); centro 2º año hembra (20-IV); abajo juvenil (22-V).

**08310** **Martín pescador común** (*Alcedo atthis*)



Martín pescador. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-IV); derecha hembra (20-V).



Martín pescador. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (26-IV); arriba derecha 2º año hembra (20-IV); izquierda juvenil (22-V).



Martín pescador. Primavera. Color de las patas: arriba adulto/2º año (07-VII); abajo juvenil (19-VI).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Macho: diseño de la cola (17-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de la cola (20-V).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho: diseño de la cola (26-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda completa. Macho: diseño de coberteras primarias (07-VI).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de la cola (20-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda interrumpida. Macho: diseño de coberteras primarias (23-IV).



Martín pescador. Primavera. Juvenil: diseño de la cola (22-V).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (20-V).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (15-V).




Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (15-V).



Martín pescador. Primavera. Juvenil: diseño de coberteras primarias (07-VI).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda completa. Macho: diseño y desgaste de primarias (17-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda interrumpida. Macho: diseño y desgaste de primarias (23-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra: diseño y desgaste de primarias (20-V).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho: diseño y desgaste de primarias (26-IV).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra: diseño y desgaste de primarias (20-IV).



Martín pescador. Primavera. Juvenil: diseño y desgaste de primarias (22-V).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda completa. Macho: diseño y desgaste de secundarias (17-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda interrumpida. Macho: diseño y desgaste de secundarias (28-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra: diseño y desgaste de secundarias (20-V).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho: diseño y desgaste de secundarias (26-IV).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra: diseño y desgaste de secundarias (20-IV).



Martín pescador. Primavera. Juvenil: diseño y desgaste de secundarias (22-V).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda completa. Macho: diseño del ala (17-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda interrumpida. Macho: diseño del ala (23-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto con muda interrumpida. Macho: diseño del ala (28-IV).



Martín pescador. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (20-V).



Martín pescador. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (26-IV).

**08310** Martín pescador común (*Alcedo atthis*)



Martín pescador. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (20-IV).



Martín pescador. Primavera. Juvenil: diseño del ala (22-V).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Macho (18-XI).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Macho (29-XII).




Martín pescador. Invierno. 1º año. Hembra (20-XII).




Martín pescador. Invierno. Adulto. Diseño del pico y plumas de la cabeza: arriba macho (18-XI); abajo hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Diseño del pico y plumas de la cabeza: arriba macho (29-XII); abajo hembra (20-XII).



Martín pescador. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (20-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (20-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (20-XII).

**08310** Martín pescador común (*Alcedo atthis*)



Martín pescador. Invierno. Adulto. Macho: diseño de la cola (18-XI).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Hembra: diseño de la cola (20-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Hembra: diseño de la cola (19-X).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (18-XI); abajo hembra (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Macho: diseño de la cola (29-XII).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (29-XII); abajo hembra (20-XII).





Martín pescador. Invierno. Adulto. Macho: diseño de primarias (18-XI).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Hembra: diseño de primarias (20-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Hembra: diseño de primarias (19-X).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Macho: diseño de secundarias (18-XI).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Macho: diseño de primarias (29-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (ala en muda: 1 plumas viejas) (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Macho: diseño de secundarias (29-XII).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Hembra: diseño de secundarias (20-XII).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (18-XI).



Martín pescador. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (19-X).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (29-XII).



Martín pescador. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (20-XII).