



Abubilla. Adulto. Macho (27-IV).

## IDENTIFICACIÓN

25-28 cm. Dorso pardo, con franjas transversales blancas y negras; pecho rosado-vinoso, con partes inferiores blancas; cabeza de color leonado con una cresta rosada con punta negra y blanca; alas y cola negras con franjas blancas; pico largo y curvado.

## ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

## EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

**Juvenil** se asemeja a una **hembra**, pero con plumas de vuelo nuevas y sin trazas de muda; la pluma más externa de la cola con punta redondeada.

**2º año** con las plumas de vuelo no mudadas muy desgastadas; si las terciarias y secundarias internas han sido cambiadas entonces con límite de muda entre estas plumas más oscuras y nuevas y el resto de plumas de vuelo juveniles retenidas desgastadas y decoloradas; si no han mudado la cola, entonces con plumas muy desgastadas.

**Adulto** sin límite de muda en las plumas de ala, que estarán nuevas; la pluma más externa de la cola con punta cuadrada.



Abubilla. Datación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto (27-IV); derecha juvenil (04-VIII).

## SEXO

En aves **adultas**, **macho** con garganta y pecho de color vinoso intenso; manto sin tinte rosado. **Hembra** con garganta y pecho rosado claro; manto con tinte rosado. Los **juveniles** se pueden sexar en casos extremos: **macho** con cabeza y pecho más rosa intenso que la **hembra**. **CUIDADO:** con plumaje desgastado las diferencias en el color del plumaje son difíciles de ver y el sexado es posible solo si se compara la pareja.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa cambiando plumas del cuerpo y a veces alguna pluma de vuelo y cola en las áreas de reproducción entre julio-agosto y terminada después en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye sólo plumas corporales, extendiéndose en algunos ejemplares a toda o la mayor parte de la cola, terciarias y secundarias internas; generalmente la muda se realiza en las áreas de invernada. Principalmente los **adultos**, y algunos **juveniles**, tienen una muda **prenupcial** que incluye sólo plumas de la cabeza y cuello.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**08460 Abubilla** (*Upupa epops*)

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Abubilla. Adulto. Hembra (17-VI).



Abubilla. 2º año. Macho (18-IV).



Abubilla. 2º año. Hembra (07-V).



Abubilla. Juvenil. Macho (04-VIII).



Abubilla. Juvenil. Hembra (26-VII).



Abubilla. Adulto.  
Diseño de la cabeza: arriba macho (27-IV); abajo hembra (17-VI).



**08460 Abubilla** (*Upupa epops*)



Abubilla. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-IV); abajo hembra (07-V).



Abubilla. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (07-V).



Abubilla. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (04-VIII); abajo hembra (26-VII).



Abubilla. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).



Abubilla. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (27-IV); derecha hembra (17-VI).



Abubilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (27-IV); derecha hembra (17-VI).



Abubilla. 2º año. Diseño de la nuca: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (07-V).



Abubilla. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (07-V).



Abubilla. Juvenil. Diseño de la nuca: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).



Abubilla. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).



Abubilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (27-IV); derecha hembra (17-VI).



Abubilla. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (27-IV); derecha hembra (17-VI).



Abubilla. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (18-IV); derecha hembra (07-V).



Abubilla. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (26-VII).



Abubilla. Adulto. Macho: diseño de primarias (27-IV).



Abubilla. Adulto. Hembra: diseño de primarias (17-VI).



Abubilla. 2º año. Macho: diseño de primarias (18-IV).



Abubilla. 2º año. Hembra: diseño de primarias (07-V).



Abubilla. Juvenil. Macho: diseño de primarias (04-VIII).



Abubilla. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (17-VI).



Abubilla. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (26-VII).




Abubilla. 2º año. Macho: diseño de secundarias (18-IV).



Abubilla. Adulto. Macho: diseño de secundarias (27-IV).



Abubilla. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (07-V).



Abubilla. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (04-VIII).



Abubilla. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (26-VII).



Abubilla. Adulto. Macho: diseño del ala (27-IV).



Abubilla. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-VI).



Abubilla. 2º año. Macho: diseño del ala (18-IV).



Abubilla. 2º año. Hembra: diseño del ala (07-V).



Abubilla. Juvenil. Macho: diseño del ala (04-VIII)



Abubilla. Juvenil. Hembra: diseño del ala (26-VII)