



Calandria común. Adulto (27-VII).

IDENTIFICACIÓN

18-20 cm. Partes superiores de color pardo, con bordes claros; cabeza sin cresta; con ceja marcada; pico grueso y fuerte; pecho finamente listado, con dos manchas laterales oscuras; alas con los bordes de las secundarias de color blanco y plumas infracoberteras oscuras. Los **juveniles** tienen ribetes blancuzcos en las plumas corporales y del ala; manchas negras del cuello poco conspicuas.



Calandria común. Diseño de cabeza y ala.

ESPECIES SIMILARES

Sólo la **terrera común** muestra dos manchas en el cuello, pero es de tamaño menor y no tiene el borde del ala con una línea blanca.



Terrera común.

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar las aves extremas: **macho** con ala mayor de 126 mm; **hembra** con ala menor de 122 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con borde claro en coberteras del ala; plumaje nuevo.

Adulto sin borde claro en coberteras del ala; plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Calandria común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.





Calandria común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.



Calandria común. Juvenil (06-VII)



Calandria común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Calandria común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (07-VII); abajo juvenil (06-VII)



MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Calandria común. Diseño del pecho: arriba adulto (07-VII); abajo juvenil (06-VII).





Calandria común. Diseño del dorso: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII).



Calandria común. Color de las patas: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII).



Calandria común. Diseño de la cola: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII).



Calandria común. Adulto: diseño del ala (07-VII).



Calandria común. Juvenil: diseño del ala (06-VII).