



Cogujada montesina. Otoño (28-XI).

IDENTIFICACIÓN

15-17 cm. Plumaje pardo; plumas externas de la cola ocre; cabeza con cresta y ceja; punta de la mandíbula inferior ligeramente convexa; pecho nítidamente estriado; supracoberteras caudales ocre contrastando con el obispillo; infracoberteras alares grises; la 10ª primaria puede ser indistintamente mayor o menor que las coberteras primarias; 8ª y 7ª primarias más largas que el resto. Los **juveniles** tienen ribetes blancuzcos en las plumas.



Cogujada montesina. Adulto: diseño de cabeza y pico, coberteras de la cola, pecho, fórmula alar e infracoberteras alares.



Cogujada montesina. Juvenil: diseño del ala, pecho, dorso, infracoberteras del ala, fórmula alar y cabeza y pico.


ESPECIES SIMILARES

De entre las especies con “moño”, la **alondra común** se separa por las plumas externas de la cola blancas. La **cogujada común** es muy parecida, pero tiene las supracoberteras caudales grises, infracoberteras alares color herrumbre, pecho de moteado más difuso, siempre la 1ª primaria más corta que las coberteras primarias y el pico más largo y con la mandíbula inferior recta. Los **juveniles** de ambas especies son difíciles de separar, debiendo recurrirse a la forma del pico, fórmula alar y al tono más claro del plumaje de la **cogujada común**.

09730 Cogujada montesina (*Galerida theklae*)



Alondra común.



Cogujada común. Adulto.



Cogujada común. Juvenil.

09730 Cogujada montesina (*Galerida theklae*)

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar las aves extremas: **macho** con ala mayor de 106 mm; **hembra** con ala menor de 104 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con nítidos bordes claros en coberteras del ala; cresta corta; plumaje nuevo.

Adulto sin borde claro nítido en coberteras del ala; cresta larga; plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Cogujada montesina. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Cogujada montesina. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Cogujada montesina. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Cogujada montesina. Primavera. Adulto (09-V).

09730 Cogujada montesina (*Galerida theklae*)



Cogujada montesina. Primavera. Juvenil (11-VII)



Cogujada montesina. Diseño del pecho: arriba en otoño (28-XI); centro adulto en primavera (09-V); abajo juvenil (11-VII).



Cogujada montesina. Diseño de la cabeza y pico: arriba en otoño (28-XI); centro adulto en primavera (09-V); abajo juvenil (11-VII).



Cogujada montesina. Diseño de la cola: arriba izquierda en otoño (28-XI); arriba derecha adulto en primavera (09-V); izquierda juvenil (11-VII).

09730 Cogujada montesina (*Galerida theklae*)




Cogujada montesina. Diseño del dorso: arriba izquierda en otoño (28-XI); arriba derecha adulto en primavera (09-V); izquierda juvenil (11-VII).



Cogujada montesina. Diseño de las patas: arriba adulto (04-V); abajo juvenil (27-VII).



Cogujada montesina. Fórmula alar: arriba adulto (04-V); abajo juvenil (27-VII).



Cogujada montesina. Otoño: diseño del ala (28-XI).



Cogujada montesina. Primavera. Adulto: diseño del ala (09-V).



Cogujada montesina. Primavera. Juvenil: diseño del ala (11-VII).