

315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí



Bisbita alpino. Primavera. Adulto (04-IV).



Bisbita alpino. Primavera. Diseño de la cabeza, pecho, patas y flanco.

BISBITA ALPINO (*Anthus spinoletta*)

IDENTIFICACIÓN

16-17 cm. Partes superiores pardo-grisáceas; ceja clara; plumas externas de la cola con mancha blanca; patas oscuras. En **verano** cabeza gris, pico negro y pecho rosado sin estrías; en **invierno** cabeza de color pardo, pico con base amarillenta y pecho blancuzco con estrías nítidas.



Bisbita alpino. Invierno. Diseño de la cabeza, pecho, patas y flanco.

ESPECIES SIMILARES

Es el único bisbita presente en Aragón que tiene las patas oscuras.



Bisbita común



Bisbita campestre



Bisbita arbóreo

315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, si bien las **hembras** tienden a tener el púleo, nuca y auriculares con más tinte marrón que los **machos**, que son más grises (**CUIDADO:** no es aconsejable el sexado utilizando únicamente el diseño del plumaje). El tamaño puede ser de ayuda en casos extremos: **macho** con ala mayor de 91 mm; **hembra** con ala menor de 87 mm.



Bisbita alpino. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje muy nuevo; pecho moteado.

1º año otoño/2º año invierno con límite de muda en las coberteras del ala entre las cambiadas, de borde ante y nuevas, y las no mudadas, más claras y desgastadas (el límite puede estar entre las pequeñas y medianas coberteras, entre medianas coberteras, grandes coberteras, terciarias o plumas de la cola); plumas de la cola no mudadas desgastadas; primarias puntiagudas.

2º año primavera con primarias, coberteras del ala y plumas de la cola no mudadas más desgastadas que en los **adultos** (**CUIDADO:** en **primavera** todas las edades tienen límites de muda, pero solo las aves de **2º año** tienen tres generaciones de plumas).

Adulto en invierno con aspecto similar al de los ejemplares de **1º/2º año**, pero tienen todas las plumas del ala de la misma generación; todas las plumas de la cola nuevas; primarias redondeadas. En **primavera** similar al **2º año**, con pecho rosado y sin motas; con dos generaciones de plumas en el ala, pero las plumas más viejas siempre menos desgastadas que en las aves de **2º año**.

CUIDADO: el diseño de las grandes coberteras internas y externas es diferente y puede simular un límite de muda.



Bisbita alpino. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las primarias: arriba adulto; abajo 1º año.



Bisbita alpino. Invierno. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



Bisbita alpino. Primavera. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



315 Bisbita alpino


Pon tu logo aquí

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, incluyendo plumas corporales, la mayor parte de las pequeñas coberteras, generalmente ninguna o unas pocas medianas coberteras y, a veces, algunas grandes coberteras internas, algunas terciarias y plumas centrales de la cola; terminada entre agosto y septiembre. De enero a marzo, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** cambiando plumas corporales (adquieren el plumaje nupcial) y algunas medianas coberteras, algunas grandes coberteras más internas, algunas terciarias y a veces las plumas centrales de la cola.



Bisbita alpino. Primavera. Juvenil (05-VII).



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Bisbita alpino. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Migrador parcial, está presente como nidificante en las cotas altas del Pirineo y Moncayo; invernante en el fondo de los valles pirenaicos y Depresión del Ebro.



Bisbita alpino. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (04-IV); centro 2º año (04-IV); abajo juvenil (05-VII).



Bisbita alpino. Primavera. 2º año (04-IV).



315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí



Bisbita alpino. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (04-IV); arriba derecha 2º año (04-IV); izquierda juvenil (05-VII).



Bisbita alpino. Primavera. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (04-IV); arriba derecha 2º año (04-IV); izquierda juvenil (05-VII).



Bisbita alpino. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (04-IV); arriba derecha 2º año (04-IV); izquierda juvenil (05-VII).

Bisbita alpino. Primavera. Adulto: diseño de coberturas del ala (05-IV).



Bisbita alpino. Primavera. 2º año: diseño de coberturas del ala (04-IV).

315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí



Bisbita alpino. Primavera. Juvenil: diseño de coberturas del ala (05-VII).



Bisbita alpino. Invierno. Adulto (25-XII).



Bisbita alpino. Primavera. Adulto: diseño del ala (05-IV).



Bisbita alpino. Invierno. 1º año (25-XII).



Bisbita alpino. Primavera. 2º año: diseño del ala (04-IV).



Bisbita alpino. Invierno. Diseño de la cabeza: arriba adulto (25-XII); abajo 1º año (25-XII).



Bisbita alpino. Primavera. Juvenil: diseño del ala (05-VII).



315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí



Bisbita alpino. Invierno. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (25-XII); derecha 1º año (25-XII).



Bisbita alpino. Invierno. Diseño de primarias: arriba adulto (25-XII); abajo 1º año (25-XII).



Bisbita alpino. Invierno. Diseño del dorso: izquierda adulto (25-XII); derecha 2º año (06-II).



Bisbita alpino. Invierno. Diseño y desgaste de la cola: izquierda adulto (25-XII); derecha 1º año (25-XII)



Bisbita alpino. Invierno. Desgaste de terciarias: izquierda adulto (25-XII); derecha 1º año (25-XII).

315 Bisbita alpino

Pon tu logo aquí



Bisbita alpino. Invierno. Adulto: diseño de medianas coberteras (25-XII).



Bisbita alpino. Invierno. 1º año: diseño de medianas coberteras (25-XII).



Bisbita alpino. Invierno. Adulto: diseño del ala (25-XII).



Bisbita alpino. Invierno. 1º año: diseño del ala (25-XII).