

# 329 Ruiseñor común

Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Primavera. Adulto (08-IV).


**RUISEÑOR COMÚN** (*Luscinia megarhynchos*)

## IDENTIFICACIÓN

15-17 cm. **Adulto** con dorso pardo y vientre pardo-grisáceo; cola pardo rojiza. **Juvenil** de color pardo con manchas ocres por encima y claro con orlas pardas por debajo; cola como los **adultos**.



Ruiseñor común. Adulto: diseño de cabeza y cola.



Ruiseñor común. Juvenil: diseño de cabeza y cola.



## ESPECIES SIMILARES

El **juvenil** es muy parecido al joven del **petirrojo** pero esta especie es de tamaño algo menor y no tiene la cola rojiza. El **adulto** puede recordar a la hembra y juveniles del **colirrojo real**, que tiene las patas oscuras y par de plumas centrales de la cola más oscuras que el resto.



Petirrojo. Juvenil.



Colirrojo real. Hembra

## SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño puede ayudar en casos extremos: **macho** con ala mayor de 90 mm; **hembra** con ala menor de 83 mm.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje moteado.

**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las grandes coberteras **juveniles** retenidas, con mancha clara en la punta, y las mudadas, sin manchas; si todas las grandes coberteras han sido cambiadas, entonces el límite de muda está entre terciarias y secundarias. **CUIDADO:** el desgaste puede hacer desaparecer las manchas claras de la punta de las coberteras **juveniles** en **primavera**.

# 329 Ruiseñor común

Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.




Ruiseñor común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Ruiseñor común. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia primeros de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y las grandes coberteras más internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; completan la muda entre finales de julio y primeros de septiembre.



Ruiseñor común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN


Especie estival, distribuida ampliamente por toda la Comunidad, faltando sólo en las zonas deforestadas del Pirineo y del Valle del Ebro.



Ruiseñor común. Primavera. 2º año (08-IV).

# 329 Ruiseñor común


Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Primavera. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año (08-IV).



Ruiseñor común. Primavera. Diseño del pecho: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año (08-IV).




Ruiseñor común. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año (08-IV).



Ruiseñor común. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año (08-IV).



Ruiseñor común. Primavera. Adulto: diseño del ala (08-IV).



Ruiseñor común. Primavera. 2º año: diseño del ala (08-IV).




Ruiseñor común. Verano. Adulto (01-VII).

# 329 Ruiseñor común

Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Verano. 2º año (01-VII).



Ruiseñor común. Verano. Juvenil (04-VII).



Ruiseñor común. Verano. Diseño y desgaste del dorso: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (04-VII).



Ruiseñor común. Verano. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (01-VII); centro 2º año; abajo juvenil (04-VII).



Ruiseñor común. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (04-VII).

# 329 Ruiseñor común

Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Verano. Juvenil: diseño del ala (04-VII).



Ruiseñor común. Verano. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (01-VII); arriba derecha 2º año (01-VII); izquierda juvenil (04-VII).



Ruiseñor común. Otoño. Adulto (10-VIII).



Ruiseñor común. Verano. Adulto: diseño del ala (01-VII).



Ruiseñor común. Otoño. 1º año (04-VIII).




Ruiseñor común. Verano. 2º año: diseño del ala (02-VI).

# 329 Ruiseñor común

Pon tu logo aquí



Ruiseñor común. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (10-VIII); abajo 1º año (04-VIII).



Ruiseñor común. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (04-VIII); derecha 1º año (04-VIII).



Ruiseñor común. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (04-VIII); derecha 1º año (04-VIII).



Ruiseñor común. Otoño. Adulto: diseño del ala (02-VIII)



Ruiseñor común. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (04-VIII); derecha 1º año (04-VIII).



Ruiseñor común. 1º año: diseño del ala (04-VIII).