

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Macho (02-V).

## COLIRROJO REAL (*Phoenicurus phoenicurus*)

### IDENTIFICACIÓN

13-15 cm. **Macho nupcial** con cara y garganta negros; frente y ceja blancos; dorso gris; alas gris pardo; **hembra** y **macho** en **otoño** con partes superiores pardas; cara y garganta sin negro (**hembras**) o con negro escondido (**machos**); ambos sexos tienen la cola roja y pecho y flancos castaños.



Colirrojo real. Macho: diseño de la cabeza.



Colirrojo real. Hembra: diseño del pecho, dorso y cola.

### ESPECIES SIMILARES

El diseño del **macho** nupcial lo hace inconfundible entre las especies con cola roja. La **hembra**, **juvenil** y **macho** inmaduro pueden recordar a un **ruiseñor común**, que es de tamaño mayor, partes inferiores blancas y sin pluma oscura central en la cola. La hembra y juvenil de **colirrojo tizón** tienen el dorso y partes inferiores grises.



Ruiseñor común



Colirrojo tizón. Hembra

### SEXO

El **macho** en plumaje **nupcial** con frente blanca y garganta negra; pecho rojizo; dorso gris. En plumaje de **otoño**, **machos** **adulto** y de **1º año** con las plumas negras de la garganta con punta blanca; la banda blanca de la frente está oculta (**adulto**) o ausente (**1º año**). La **hembra** carece de blanco en la frente y de negro en la garganta; pecho anaranjado; dorso pardo (**CUIDADO**: hay algunas **hembras** con plumaje que recuerda al **macho** pero no tienen nunca las plumas de la garganta con base negra). No es posible sexar los **juveniles** utilizando el plumaje.

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Colirrojo real. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Colirrojo real. Otoño. Determinación del sexo. Diseño del pecho: arriba adulto macho; centro 1º año macho; abajo hembra.



Colirrojo real. Otoño. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho; centro 1º año macho; abajo hembra.



## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con el plumaje nuevo y moteado.

**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las grandes coberteras internas mudadas y las juveniles ante-marrón retenidas (**CUIDADO:** es un contraste evidente en los machos, con plumas mudadas grises, pero más difícil de ver en las hembras, con plumas mudadas sólo ligeramente teñidas de gris); plumas de la cola puntiagudas.

**Adulto** sin límites de muda en el ala; plumas de la cola con puntas redondeadas. (**CUIDADO:** en primavera las hembras son difíciles de datar: revisar diferencias en el desgaste y color entre las grandes coberteras).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Colirrojo real. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.



Colirrojo real. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Colirrojo real. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.




Colirrojo real. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, coberteras pequeñas y medianas y algunas grandes coberteras internas; excepcionalmente algunos ejemplares incluyen plumas de la cola, terciarias y secundarias internas; suele estar terminada a primeros de septiembre.

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



■ Todos los ejemplares  
 ■ Algunos ejemplares

Colirrojo real. Extensión de la muda postjuvenil.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival raro como nidificante en las partes más altas del Sistema Ibérico y sierras exteriores del Pirineo; común en los pasos migratorios.



Colirrojo real. Primavera. 2º año. Hembra (12-IV)



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Hembra (26-IV).



Colirrojo real. Primavera. Juvenil (01-07).



Colirrojo real. Primavera. 2º año. Macho (23-IV).



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-V); abajo hembra (26-IV).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (23-IV); centro 2º año hembra (13-IV); abajo juvenil (01-07).



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (02-V); derecha hembra (26-IV).



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (02-V); derecha hembra (26-IV).



Colirrojo real. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (13-IV); izquierda juvenil (01-07).



Colirrojo real. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (13-IV); izquierda juvenil (01-07).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (02-V); derecha hembra (26-IV).



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (26-IV).



Colirrojo real. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (23-IV).



Colirrojo real. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto 2º año macho (23-IV); arriba derecha 2º año hembra (13-IV); izquierda juvenil (01-07).



Colirrojo real. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (13-IV).



Colirrojo real. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (02-V).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Primavera. Juvenil: diseño del ala (01-07).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Macho (15-VIII).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Macho (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Hembra (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Hembra (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (06-IX); abajo hembra (06-IX).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (15-VIII); abajo hembra (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-IX); derecha hembra (06-IX).

# 332 Colirrojo real

Pon tu logo aquí



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (23-IX).



Colirrojo real. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-IX).



Colirrojo real. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (06-IX).