




Cetia ruiseñor. Primavera. Adulto (17-V).

### IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Partes superiores pardo-rojizas; ceja y partes inferiores blancuzcas; cola redondeada con sólo 10 plumas.



Cetia ruiseñor. Diseño de la cabeza, infracoberteras de la cola y número de plumas de la cola.

### ESPECIES SIMILARES

Recuerda a un **carricero** o a la **buscarla unicolor**, pero se diferencia de todas las especies de plumaje pardo por tener 10 plumas en la cola en vez de 12.



Carricero común.



Buscarla unicolor.

<http://blascozumeta.com>

### SEXO

Plumaje similar en ambos sexos. El tamaño permite sexar a la mayoría de los ejemplares: en **Aragón**, **macho** con ala mayor de 59 mm; **hembra** con ala menor de 55 mm (**CAUIDADO**: el tamaño de la especie varía según su localización geográfica).

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con el mismo aspecto que el **adulto**, con plumaje nuevo; con dos puntos negros en la lengua, algunos hasta el mes de diciembre; plumas de la cola estrechas; iris gris oscuro.

**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las grandes coberteras cambiadas, de borde más ancho, y las **juveniles** retenidas, de margen estrecho y marrón menos intenso; conservan siempre sin cambiar las coberteras primarias; plumas de la cola **juveniles** no mudadas estrechas; algunos ejemplares mantienen alguna infracobertera caudal **juvenil**, con coloración y estructura diferente a las mudadas. **CAUIDADO**: si todas las grandes coberteras han sido mudadas, entonces el límite está entre terciarias o entre terciarias y las plumas de vuelo.

**Adulto** con ala sin límites de muda; plumas de la cola anchas; iris rojizo.




Cetia ruiseñor. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Cetia ruiseñor. Determinación de la edad. Anchura de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

<http://www.aranzadi.org>

# 12200 *Cetia ruseñor* (*Cettia cetti*)



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

*Cetia ruseñor*.  
Extensión de la muda postjuvenil.



*Cetia ruseñor*. Primavera. Juvenil (24-VI).

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, gran parte de las grandes coberteras internas y alguna terciaria; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y a un número variable de plumas de vuelo, dejando siempre sin cambiar las coberteras primarias; generalmente terminada en septiembre. Ambos tipos de edad pueden tener una muda **prenupcial** cambiando plumas corporales, coberteras alares y alguna terciaria.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso



*Cetia ruseñor*. Primavera. 2º año (14-V).



*Cetia ruseñor*. Primavera. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (17-V); centro 2º año (14-V); abajo juvenil (24-VI)



*Cetia ruseñor*. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (17-V); arriba derecha 2º año (14-V); izquierda juvenil (24-VI).


**12200** **Cetia ruiseñor** (*Cettia cetti*)



Cetia ruiseñor. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (17-V); arriba derecha 2º año (14-V); izquierda juvenil (24-VI).



Cetia ruiseñor. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (17-V); arriba derecha 2º año (14-V); izquierda juvenil (24-VI).



Cetia ruiseñor. Primavera. Diseño de las infracoberturas de la cola: arriba adulto (07-V); centro 2º año (14-V); abajo juvenil (24-VI).



Cetia ruiseñor. Primavera. Adulto: diseño del ala (17-V).

**12200** **Cetia ruseñor** (*Cettia cetti*)



Cetia ruseñor. Primavera. 2º año: diseño del ala (14-V).



Cetia ruseñor. Primavera. Juvenil: diseño del ala (24-VI).



Cetia ruseñor. Otoño. Adulto (20-XII).



Cetia ruseñor. Otoño. 1º año (16-X).



Cetia ruseñor. Otoño. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (20-XII); abajo 1º año (16-X).



Cetia ruseñor. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (20-XII); derecha 1º año (16-X).

# 12200 *Cetia ruiñeñor* (*Cettia cetti*)



*Cetia ruiñeñor*. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (20-XII); derecha 1º año (16-X).



*Cetia ruiñeñor*. Otoño. Diseño de las infracoverterras de la cola: arriba adulto (20-XII); abajo 1º año (16-X).



*Cetia ruiñeñor*. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (20-XII); derecha 1º año (16-X).



*Cetia ruiñeñor*. Otoño. Adulto: diseño del ala (20-XII).



*Cetia ruiñeñor*. Otoño. 1º año: diseño del ala (25-VII).