



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda no comenzada (07-VII).

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Plumaje pardo, con partes inferiores más claras; cola ancha; patas pardo-oliva; sin cerdas en la comisura de la boca.



Buscarla unicolor. Diseño de la cola y ausencia de cerdas en la boca.

ESPECIES SIMILARES

Parecida al **carricero común**, que tiene cerdas en la comisura de la boca y cola con plumas de similar longitud; el **ruiseñor bastardo** tiene 10 plumas en la cola.



R u i s e ñ o r
b a s t a r d o .



Carricero común.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD


No se encuentran **juveniles** en Aragón, por lo que pueden reconocerse sólo 2 tipos de edad:

1º año generalmente con las plumas del ala de la misma generación y nuevas (**CAIDADO**: algunos ejemplar puede tener límites de muda en las plumas de vuelo pero entonces las plumas viejas están poco desgastadas); habitualmente con dos puntos negros en la lengua (**CAIDADO**: algunos ejemplares carecen de ellos); iris pardo gris; comisura de la boca amarilla y bien marcada.

Adulto con las plumas del ala de la misma generación pero desgastadas o con dos generaciones de plumas si bien entonces las plumas más viejas están muy desgastadas (**CAIDADO**: los ejemplares que tienen muda completa en su área de cría tienen todas las plumas del ala nuevas); sin puntos negros en la lengua; iris pardo rojizo; comisura de la boca rosa y poco marcada.

Después de la muda **prenupcial** no es posible una datación segura de la edad utilizando el plumaje.

12380 **Buscarla unicolor** (*Locustella luscinioides*)



Buscarla unicolor. Determinación de la edad. Diseño de la comisura de la boca y color del iris: arriba adulto; abajo 1º año.



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda completa (05-IX).

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que puede ser terminada en las zonas de cría, suspenderla antes de la migración y acabarla en las áreas de invernada o comenzarla después de la migración. La muda **postjuvenil** puede o no existir o tener una extensión variable cambiando algunas primarias externas, terciarias y grandes coberteras. Ambos tipos de edad tienen en invierno una muda **prenupcial** muy variable que puede ser parcial, dejando algunas primarias o coberteras primarias sin cambiar, completa o suspendida, para ser terminada durante la migración de primavera.



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año no mudado (06-IX).

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda suspendida (18-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año con muda suspendida (24-VIII).

12380 **Buscarla unicolor** (*Locustella luscinioides*)



Buscarla unicolor. Otoño. Diseño de la cabeza, comisura de la boca y color del iris: arriba adulto (05-IX); centro adulto (18-IX); abajo 1º año (06-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda con muda no comenzada (07-VII); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda completa (05-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda con muda no comenzada (07-VII); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda completa (05-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).

12380 *Buscarla unicolor* (*Locustella luscinioides*)



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: arriba izquierda con muda no comenzada (07-VII); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda completa (05-IX)



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda no comenzada: diseño del ala (07-VII).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda suspendida: diseño del ala (18-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda completa: diseño del ala (05-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año no mudado: diseño del ala (06-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año con muda suspendida: diseño del ala (24-VIII).