


12430 Carricerín común (*Acrocephalus schoenobaenus*) 



Carricerín común. Primavera (24-III).

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Dorso pardo rojizo, marcadamente listado; partes inferiores blanco amarillentas; obispillo leonado; ceja clara bien marcada; capirote rayado de oscuro.




Carricerín común. Diseño de cabeza y píleo.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda un **carricero común**, que no tiene la cabeza listada. Más parecido al **carricerín cejudo**, que tiene una lista blanca a lo largo del píleo (**CAUIDADO**: algunos **juveniles** de **carricerín común** pueden presentar una lista blanca en el píleo hasta que hacen su muda **postjuvenil**), y al **carricerín real**, que tiene el píleo casi negro, ceja blanca más ancha y garganta blanca.



Carricero común.



Carricerín real.



Carricerín cejudo.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.


EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris marrón oscuro; pecho con puntos pardo oscuro.

Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris marrón claro o rojizo; pecho liso, sin motas.


En **primavera**, después de las mudas **postnupcial/postjuvenil**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Carricerín común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.



Carricerín común. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Carricerín común. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial que incluye en las zonas de cría plumas corporales y, a veces, terciarias y alguna pluma de la cola o vuelo, finalizada en las áreas de invernada. Sin muda **postjuvenil** (o solo algunas plumas del cuerpo) en las zonas de cría, pero completa en las áreas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Invernante

■ Residente

■ En paso



Carricerín común. Otoño. Adulto (25-VIII).





Carricerín común. Otoño. Juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).

12430 Carricerín común (*Acrocephalus schoenobaenus*)



Carricerín común. Diseño del capirote: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba en primavera (30-III); centro adulto en otoño (25-VIII) adultos; abajo juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Desgaste del plumaje: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (24-III); arriba derecha adulto en otoño (25-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Carricerín común. Primavera: diseño del ala (24-III).



Carricerín común. Otoño. Adulto: diseño del ala (25-VIII).



Carricerín común. Otoño. Juvenil: diseño del ala (13-VIII).