



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Macho (05-IV).

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm, ala entre 48-56 mm. Dorso de color gris oscuro; partes inferiores vinosas; cola larga, con plumas externas con borde blanco; alas pardo oscuro; patas pardo amarillentas; anillo ocular de color rojo; garganta vinosa, con moteado blanco. Los **juveniles** tienen el dorso pardo y partes inferiores pardo-rojizo.



Curruca rabilarga. Diseño de cabeza y dorso.



ESPECIES SIMILARES

El aspecto oscuro, cola larga y garganta vinosa moteada de blanco hacen inconfundible a esta especie.

SEXO

Macho con cabeza y dorso gris pizarra oscuro; partes inferiores rosa pardo intenso; mentón y garganta rojo vinoso con puntos blancos bien marcados. **Hembra** con cabeza y dorso pardo gris; partes inferiores ante rosado; mentón y garganta rojo claro con puntos blancos pequeños y poco marcados (**CUIDADO**: a veces las diferencias son muy ligeras y difíciles de determinar sin una comparación directa). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño de cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD


Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; tonos apagados, sin tinte rojizo en las partes inferiores ni en la garganta; iris oliva-marrón.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda en el ala entre las plumas mudadas más oscuras y las **juveniles** marrones conservadas; las nunca mudadas coberteras primarias **juveniles** marrones con borde ante-marrón.

Adulto con las plumas del ala de la misma generación; coberteras primarias grises con borde marrón-gris; iris de color rojizo.


CUIDADO: en **primavera**, después de la muda **pre-nupcial**, ambos tipos de edad pueden mostrar límite de muda en el ala o cola.



Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y color del iris: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.




Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, la mayor parte o todas grandes coberteras, álula, terciarias y parte de la cola algunos ejemplares que pueden mudar varias secundarias internas, alguna primaria externa y toda la cola; suele estar terminada en octubre. Ambos tipos de edad tienen, pero no siempre, una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales y algunas terciarias y plumas de la cola.

12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Curruca rabilarga. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Hembra (21-III).



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Macho (13-IV).



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Hembra (10-IV).



Curruca rabilarga. Primavera. Juvenil (28-V).



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (05-IV); abajo hembra (21-III).

12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda 2º año macho (13-IV); arriba derecha 2º año hembra (10-IV); izquierda juvenil (28-V).



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (05-IV); derecha hembra (21-III).



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (13-IV); arriba derecha 2º año hembra (10-IV); izquierda juvenil (28-V).



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (05-IV); derecha hembra (21-III).



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (13-IV); arriba derecha 2º año hembra (10-IV); izquierda juvenil (28-V).

12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (05-IV); derecha hembra (21-III).



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (13-IV); arriba derecha 2º año hembra (10-IV); izquierda juvenil (28-V).



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (05-IV).



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (21-III).

12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (13-IV).



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (10-IV).



Curruca rabilarga. Primavera. Juvenil: diseño del ala (28-V).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Macho (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Macho (06-X).

12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (06-X); abajo hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (06-X); abajo hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).


12620 **Curruca rabilarga** (*Curruca undata*)



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto/1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (06-X); derecha hembra (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (06-X).



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (06-X).