




Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Macho (01-VI).

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm; ala entre 57-64 mm. **Macho** con cabeza y espalda gris; garganta y pecho anaranjados; anillo ocular e iris rojizos. **Hembra** más apagada que el macho, con dorso pardo; partes inferiores blancuzcas; anillo ocular blanco e iris gris-marrón; 10ª primaria de la misma longitud que las coberteras primarias; ambos sexos tienen una "bigotera" blanca (más marcada en el macho) y patas claras. Los juveniles son parecidos a la hembra, sin gris y con los flancos ante.



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca carrasqueña. Juvenil. Diseño de terciarias. dorso y longitud de 10ª primaria.


ESPECIES SIMILARES

El macho podría confundirse con la **curruca rabilarga**, que no tiene bigotera blanca y el naranja del cuello está punteado de blanco. La hembra recuerda a la de la **curruca tomillera**, que tiene las alas canelas y carece de "bigotera" y gris en la cabeza. Los juveniles son difíciles de separar de los de la **curruca tomillera**, que tienen las grandes cobertoras, terciarias y secundarias con grandes bordes ocre y algunos el ala menor de 55 mm.; los de **curruca cabecinegra** son más oscuros por encima y tienen los flancos pardo y no ante; el aspecto del plumaje es más "suelto" y la 10ª primaria suele ser mayor que las coberteras primarias.



Curruca rabilarga.






Curruca tomillera. Hembra.



Curruca tomillera. Juvenil.



Curruca cabecinegra. Juvenil.

SEXO

En **primavera**, **macho** con dorso gris; anillo ocular rojo; bigotera blanca; garganta y pecho rojizos. **Hembra** con colores más atenuados; anillo ocular blanco; garganta y pecho claros (**CAUIDADO**: algunos **machos de 2º año** son muy parecidos a **hembras adultas**). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje. En **otoño**, después de la muda **postjuvenil**, existe un ligero dimorfismo sexual en aves de **1º año**: **macho** predominantemente gris con tinte naranja-marrón en las partes inferiores; **hembra** marrón y sin tinte anaranjado en las partes inferiores (**CAUIDADO**: muchos ejemplares son intermedios y se recomienda sexar sólo los ejemplares con aspecto de **macho**); **adultos** como en **primavera**.



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

12654 **Curruca carrasqueña occidental** (*Curruca iberiae*)



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; sin límites de muda; plumas externas de la cola con borde marrón; iris gris-oliva.

1º año otoño con límites de muda en el ala entre las coberteras alares y terciarias cambiadas, de color gris oscuro, contrastando con las plumas de vuelo, coberteras primarias y a veces grandes coberteras externas **juveniles** retenidas, más desgastadas y de color marrón claro; si no se han mudado, entonces las plumas externas de la cola con borde marrón; iris oscuro.

2º año primavera con límite de muda en el ala entre las plumas mudadas y las **juveniles** conservadas, habitualmente plumas de vuelo, coberteras primarias y a veces grandes coberteras externas, muy desgastadas y de color marrón; si no se han mudado, entonces el borde de las plumas externas de la cola está teñido de marrón.

Adulto en otoño sin límites de muda en el ala; todas las grandes coberteras con borde grisáceo; borde de las plumas externas de la cola blanco (**CUIDADO**: algunos ejemplares lo tienen gris); iris rojizo.

CUIDADO: en **primavera**, después de la muda **pre-nupcial**, ambos tipos de edad muestran límite de muda en el ala; algunas aves de **2º año** han hecho una muda completa siendo indistinguibles de los **adultos**.



Curruca carrasqueña. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Curruca carrasqueña. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto hembra; derecha 1º año hembra.


12654 *Curruca carrasqueña occidental* (*Curruca iberiae*)



Curruca carrasqueña. Otoño Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y todas o la mayor parte de las grandes coberteras; algunos ejemplares pueden mudar terciarias y alguna pluma de la cola; generalmente terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial (más extensa en aves de **2º año**) que incluye todas o parte de terciarias y plumas de la cola, ninguna a todas las grandes coberteras y algunas secundarias internas.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Curruca carrasqueña. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Hembra (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. 2º año. Macho (05-VII).




Curruca carrasqueña. Primavera. 2º año. Hembra (21-V).


12654 **Curruca carrasqueña occidental** (*Curruca iberiae*) 



Curruca carrasqueña. Primavera. Juvenil (13-VII).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza, anillo ocular y color del iris: arriba macho (01-VI); abajo hembra (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza, anillo ocular y color del iris: arriba 2º año macho (05-VII); centro 2º año hembra (21-V); abajo juvenil (13-VII).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (05-VII); arriba derecha 2º año hembra (21-V); izquierda juvenil (13-VII).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (05-VII); arriba derecha 2º año hembra (21-V); izquierda juvenil (13-VII).



Curruca carrasqueña. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (05-VII); arriba derecha 2º año hembra (21-V); izquierda juvenil (13-VII).



Curruca carrasqueña. Color de las patas: arriba izquierda adulto (25-V); arriba derecha 1º año (06-VIII); izquierda juvenil (07-VII).

12654 **Curruca carrasqueña occidental** (*Curruca iberiae*)



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (01-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (11-VI).



Curruca carrasqueña. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (05-VII).



Curruca carrasqueña. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (21-V).



Curruca carrasqueña. Primavera. Juvenil: diseño del ala (13-VII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Macho (12-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Hembra (09-VIII).

12654 **Curruca carrasqueña occidental** (*Curruca iberiae*)



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Macho (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Hembra (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (12-VIII); abajo hembra (09-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (15-VIII); abajo hembra (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (12-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (15-VIII).

12654 **Curruca carrasqueña occidental** (*Curruca iberiae*)



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (12-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (12-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (15-VIII); derecha hembra (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (12-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (09-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (15-VIII).



Curruca carrasqueña. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (15-VIII).