



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Macho (16-V).

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. **Macho** con píleo negro pardusco que se extiende por debajo del ojo; dorso gris pardo, liso; partes inferiores blancas, con tonos rosados; alas oscuras; cola con bordes blancos; patas oscuras.



Curruca mirlona. Adulto. Diseño de la cabeza.

ESPECIES SIMILARES

De las especies próximas, el **macho** de **curruca capirotada** tiene el negro por encima del ojo. El **macho** de **curruca cabecinegra** es más pequeño, tiene anillo ocular rojo y sus patas son claras.



Curruca capirotada. Macho.



Curruca cabecinegra. Macho.

SEXO

En **primavera**, **macho** con la cabeza uniformemente negro-gris, sin destacar (o sólo muy poco) las plumas auriculares; anillo ocular negro. **Hembra** con cabeza grisácea, con las plumas auriculares más oscuras; anillo ocular blanco con algunas plumas grises. (**CUIDADO: los machos de 2º año** suelen ser iguales a las **hembras adultas**). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

En **otoño**, **adulto macho** con la cabeza uniformemente negro-gris, sin que destaquen las plumas auriculares o sólo ligeramente más oscuras; anillo ocular negro; partes inferiores blancas, con algo de tinte gris-rosado. **Adulto hembra** con la cabeza más gris que el **macho**, destacando las plumas auriculares más negras; anillo ocular blanco o con plumas grises; partes inferiores como el **macho** pero con tinte rosado menos extenso. Después de la muda **postjuvenil**, sólo es posible sexar algunos ejemplares de **1º año** extremos: el **macho** tiende a tener la cabeza más oscura que la **hembra** y plumas auriculares más oscuras bien marcadas; anillo ocular de color gris. **Hembra** con cabeza gris claro y plumas auriculares poco marcadas; anillo ocular de color gris con tinte marrón.



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



12720 **Curruca mirlo** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlo. Primavera. 2º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca mirlo. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca mirlo. Otoño. 1º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo, sin límites de muda; iris oscuro marrón-oliva; píleo marrón oscuro con poco contraste con los lados de la cabeza; plumas externas de la cola con bordes crema-marrón.

1º año otoño similar al **juvenil**, pero con límite de muda en el ala entre las más oscuras pequeñas y medianas coberteras y las grandes coberteras no mudadas; si hay algunas grandes coberteras mudadas entonces con límite entre las internas grises y las externas **juveniles** marrones conservadas; píleo gris.

2º año primavera fácil de ver en algunos ejemplares que no tienen todavía el color amarillo claro del iris de los **adultos**; coberteras primarias muy gastadas; algunos ejemplares retienen las plumas de la cola **juveniles**, que estarán muy gastadas (**CAUIDADO**: hay ejemplares de **2º año** con iris y cola similares a los de los adultos).

Adulto en **otoño** con las plumas del ala de la misma generación (**CAUIDADO**: los ejemplares que han suspendido la muda tienen secundarias muy gastadas); iris blancuzco; plumas externas de la cola con borde blanco.


CAUIDADO: Después de la **muda prenupcial**, tanto las aves de **2º año** como **adultos** muestran límite de muda.



Curruca mirlo. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: de arriba hacia abajo: adulto hembra; 2º año hembra; 1º año; juvenil.




Curruca mirlona. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda 1º año; derecha juvenil.



Curruca mirlona. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: de arriba hacia abajo: adulto; 2º año; 1º año; juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de septiembre (**CUIDADO**: algunos ejemplares suspenden la muda (generalmente secundarias) para terminarla en sus áreas de invernada). La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y algunas grandes coberteras internas; algunos ejemplares la extienden a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; suele estar terminada en agosto. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye una parte de las plumas corporales, un número variable de grandes coberteras, algunas terciarias y secundarias y algunas plumas de la cola (las aves de **2º año** habitualmente cambian toda la cola).



Curruca mirlona. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Hembra (16-V).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Macho (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-V); abajo hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (16-V); centro 2º año hembra (16-V); abajo juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho con cola no mudada (16-V); arriba derecha 2º año hembra con cola mudada (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (16-V).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Juvenil: diseño del ala (21-VI)



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Macho (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Macho (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Hembra (23-VII).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (17-VIII); abajo hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (23-VII); abajo hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).

12720 **Curruca mirlona** (*Curruca hortensis*)



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).




Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (23-VII).