



Curruca mosquitera. Primavera (18-V).

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Especie sin caracteres llamativos, con plumaje pardo oliva en el dorso y más claro en las partes inferiores.



Curruca mosquitera.
Diseño de cabeza y dorso.



ESPECIES SIMILARES

Puede llegar a recordar un **carricero común**, que tiene la base del pico anaranjada y las patas amarillentas.



Carricero común.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; plumas de la cola puntiagudas; iris gris oscuro.

Adulto en **otoño** con plumaje gastado, principalmente primarias, grandes coberteras no mudadas y terciarias; plumas de la cola redondeadas; iris rojizo.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Curruca mosquitera. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

12760 **Curruca mosquitera** (*Sylvia borin*)




Curruca mosquitera. Otoño. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Curruca mosquitera. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de grandes coberteras: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, desde junio hasta septiembre, que abarcan plumas corporales y unas pocas coberteras del ala; unos pocos **adultos** comienzan la muda de las plumas de vuelo y cola en las zonas de cría para detenerla antes de la migración otoñal. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** completa en sus áreas de invernada.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Curruca mosquitera. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Curruca mosquitera. Otoño. Adulto (31-VIII).



Curruca mosquitera. Otoño. Juvenil (13-VIII).

12760 **Curruca mosquitera** (*Sylvia borin*)



Curruca mosquitera. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba izquierda en primavera (02-V); arriba derecha adulto en otoño (31-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).




Curruca mosquitera. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (02-V); arriba derecha adulto en otoño (31-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Curruca mosquitera. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (02-V); arriba derecha adulto en otoño (31-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Curruca mosquitera. Diseño y desgaste del dorso: arriba izquierda en primavera (18-V); arriba derecha adulto en otoño (31-VIII); izquierda juvenil (13-VIII).



Curruca mosquitera. Otoño. Color de las patas: izquierda adulto (22-V); derecha juvenil (22-VII).



Curruca mosquitera. Primavera: diseño del ala (02-V).



Curruca mosquitera. Otoño. Adulto: diseño del ala (31-VIII).



Curruca mosquitera. Otoño. Juvenil: diseño del ala (13-VIII).