

**12770** **Curruca capiroxada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capiroxada. Primavera. Adulto. Macho (16-III).

**IDENTIFICACIÓN**

13-15 cm. Dorso de tonos grises; partes inferiores pardo claro: píleo característico por encima de los ojos, negro en el **macho**, pardo-rojizo en la **hembra** y en los **juveniles**; cola gris.



Curruca capiroxada. Adulto. Diseño de cola y cabeza: arriba macho; abajo hembra.

**ESPECIES SIMILARES**

Es la única especie que tiene capirote negro/pardo por encima del ojo.



Curruca cabecinegra. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca mirlona. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho; derecha hembra.

**SEXO**

**Macho** con píleo negro; plumaje más gris que el de la **hembra**. **Hembra** con píleo pardo-rojizo; plumaje más pardo que el del **macho**. **CUIDADO:** los **juveniles** son similares a la **hembra** y no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje, siendo por tanto importante datar bien la edad antes de la muda **postjuvenil**.



Curruca capiroxada. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** parecido a la **hembra** pero con píleo marrón apagado; plumaje nuevo; iris marrón-gris oscuro.


**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las grandes coberteras (las internas mudadas con borde verdoso y las **juveniles** retenidas con borde marrón), entre terciarias o entre terciarias y secundarias (**CUIDADO:** las terciarias **juveniles** son más grises que las secundarias **juveniles**, lo que puede simular un límite de muda); algunos **machos** tienen plumas marrones mezcladas en el píleo negro (**CUIDADO:** hay **machos de 1º año** con el píleo completamente negro por lo que este diseño no indica necesariamente **macho adulto**); iris oscuro hasta octubre.

**Adulto en otoño** con las plumas del ala de la misma generación; píleo negro puro sin plumas marrones mezcladas (**CUIDADO:** algunos **machos de 1º año** tienen el píleo negro puro también); iris rojizo.



**CUIDADO:** en **primavera**, ambos tipos de edad pueden mostrar límites de muda en el ala si han hecho una muda **prenupcial**.

**Adulto** a menudo con las plumas de cola más redondeadas pero poco utilizable debido al solapamiento con **1º año**.




**12770** **Curruca capirotada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capirotada. Determinación de la edad. Diseño del capirote: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Curruca capirotada. Determinación de la edad. Color del ojo: arriba adulto hembra; abajo juvenil.




Curruca capirotada. Macho. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda adulto/1º año; derecha 1º año.



Curruca capirotada. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye pileo, plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y de 3 internas a todas las grandes coberteras; muchos ejemplares la extienden a terciarias y algunos cambian varias coberteras primarias y algunas plumas de vuelo; suele estar terminada en octubre. Algunos ejemplares, de ambos tipos de edad, tienen una muda **prenupcial**, entre diciembre-marzo, que incluye terciarias y algunas grandes coberteras internas.



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Curruca capirotada. Extensión de la muda postjuvenil.

**12770** **Curruca caprotada** (*Sylvia atricapilla*)

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Curruca caprotada. Primavera. 2º año. Hembra (13-IV).



Curruca caprotada. Primavera. Adulto. Hembra (23-III).



Curruca caprotada. Juvenil (29-VI).



Curruca caprotada. Primavera. 2º año. Macho (21-III).



Curruca caprotada. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (16-III); abajo hembra (23-III).

**12770** **Curruca capirotada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-III); derecha hembra (23-III).



Curruca capirotada. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (21-III); arriba derecha 2º año hembra (23-IV); izquierda juvenil (29-VI).



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-III); derecha hembra (23-III).



Curruca capirotada. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (21-III); arriba derecha 2º año hembra (23-IV); izquierda juvenil (29-VI).



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-III); derecha hembra (23-III).



Curruca capirotada. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (21-III); arriba derecha 2º año hembra (23-IV); izquierda juvenil (29-VI).



Curruca capirotada. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (21-III); arriba derecha 2º año hembra (23-IV); izquierda juvenil (29-VI).



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-III); derecha hembra (23-III).



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (16-III).



Curruca capirotada. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (23-III).



Curruca capirotada. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (16-III).



Curruca capirotada. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (13-IV).



Curruca capirotada. Primavera. Juvenil: diseño del ala (29-VI).

**12770** **Curruca capiroxada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Macho (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Hembra (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Hembra (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (16-IX); abajo hembra (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Macho (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (16-IX); abajo hembra (16-IX).

**12770** **Curruca capilotada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capilotada. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capilotada. Otoño. 1º año. Diseño del capirote: arriba macho (13-IX); izquierda hembra (13-IX).



Curruca capilotada. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capilotada. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capilotada. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capilotada. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



**12770** **Curruca capiroxada** (*Sylvia atricapilla*)



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-X).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (16-IX); derecha hembra (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (16-IX).



Curruca capiroxada. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (23-IX).