

378 Mosquitero papialbo

Pon tu logo aquí



Mosquitero papialbo. Primavera (13-IV).


MOSQUITERO PAPIALBO (*Phylloscopus bonelli*)

IDENTIFICACIÓN


10-11 cm. Partes superiores pardo-gris, con tonos verdosos; partes inferiores blancas; obispillo, bordes de coberteras y de las plumas del ala de color amarillo-verdoso; ceja blanca; patas claras.



Mosquitero papialbo. Diseño de pecho y obispillo.



Mosquitero ibérico



Mosquitero común

ESPECIES SIMILARES

Las partes inferiores blanco puro lo hacen fácil de separar de los otros mosquiteros como el **mosquitero ibérico** y el **mosquitero común**, que tienen patas oscuras y emarginada desde la 5ª primaria. El **mosquitero musical** tiene patas claras, pero es más amarillo y sin contraste entre el obispillo amarillo y el dorso. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.




Mosquitero musical



378 Mosquitero papialbo

Pon tu logo aquí




Mosquitero silbador



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Zarcero común



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con el plumaje nuevo; obispillo amarillento con poco contraste con el dorso.

Adulto con las plumas de la cola y el ala desgastadas (excepto alguna cobertera y pluma de vuelo mudada); obispillo amarillo con marcado contraste con el dorso.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Mosquitero papialbo. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste y límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

378 Mosquitero papialbo

Pon tu logo aquí

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría, que incluye plumas corporales y coberteras del ala; a veces también terciarias y plumas de la cola. La muda **postjuvenil** es parcial, abarcando sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada (**CUIDADO:** ejemplares de ambas edades pueden retener algunas plumas de vuelo no mudadas).

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival común en todos los bosques montanos de la Comunidad, faltando sólo en las áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.



Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto (06-VII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño del pecho: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).

Mosquitero papialbo. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (13-IV); centro adulto en otoño (06-VII); abajo juvenil (10-VIII).

378 Mosquitero papialbo

Pon tu logo aquí



Mosquitero papialbo. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (22-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (13-IV); arriba derecha adulto en otoño (07-VII); izquierda juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Diseño del obispillo: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (10-VIII).



Mosquitero papialbo. Primavera: diseño del ala (13-IV).

378 Mosquitero papialbo

Pon tu logo aquí



Mosquitero papialbo. Otoño. Adulto: diseño del ala (07-VII).



Mosquitero papialbo. Otoño. Juvenil: diseño del ala (10-VIII).