



Herrerillo capuchino. Primavera. Adulto (03-V).

### IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Partes superiores grises; partes inferiores blancuzcas; garganta negra; cabeza con mejillas claras y lista ocular negra; píleo con "moño" de plumas negras ribeteadas de blanco.



Herrerillo capuchino. Diseño de la cabeza.

### ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

### SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 63 mm; **hembra** con ala menor de 59 mm.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con el plumaje nuevo; plumas de la cola puntiagudas; iris pardo-gris; cresta corta.

**1º año otoño/2º año primavera** con las rectrices juveniles puntiagudas, habitualmente desgastadas desde finales del **otoño**; si se han cambiado algunas grandes coberteras, entonces con límite de muda entre las mudadas internas de color ante-marrón y las externas juveniles retenidas de color pardo apagado; habitualmente el color pardo del iris se mantiene hasta febrero.

**Adulto** con las plumas de la cola redondeadas; iris rojizo; cresta larga.




Herrerillo capuchino. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; centro 1º año; abajo juvenil.



Herrerillo capuchino. Primavera. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 2º año.


**14540** **Herrerillo capuchino** (*Lophophanes cristatus*) 



Herrerillo capuchino. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas o todas la grandes coberteras y una o más terciarias; no suelen cambiar plumas de la cola; habitualmente terminada en septiembre.



Herrerillo capuchino. Extensión de la muda postjuvenil.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Herrerillo capuchino. Primavera. 2º año (03-V).



Herrerillo capuchino. Primavera. Juvenil (02-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño de la cabeza y color de los ojos: arriba adulto (03-V); centro 2º año (03-V); abajo juvenil (20-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (03-V); arriba derecha 2º año (03-V); izquierda juvenil (20-VII).



Herrerillo capuchino. Primavera. Adulto: diseño del ala (03-V).



Herrerillo capuchino. Primavera. 2º año: diseño del ala (03-V).



Herrerillo capuchino. Primavera. Juvenil: diseño del ala (02-VII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Adulto (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. 1º año (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño de la cabeza y color de los ojos: arriba adulto (26-XII); abajo 1º año (26-XII).



**14540** **Herrerillo capuchino** (*Lophophanes cristatus*) 



Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del pileo: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (26-XII); derecha 1º año (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. Adulto: diseño del ala (26-XII).



Herrerillo capuchino. Otoño. 1º año: diseño del ala (26-XII).