



Herrerillo común. Adulto. Macho (06-I).

### IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Pileo, alas y cola de color azul; dorso verdoso; partes inferiores amarillentas; mejillas y banda del ala blancas.



Herrerillo común. Diseño de la cabeza.

### ESPECIES SIMILARES


No existe posibilidad de confusión con ninguna otra especie.

### SEXO

**Macho** con las coberteras del ala con borde azul intenso. **Hembra** con las coberteras del ala con bordes gris azulado (**CAUTION:** existen ejemplares intermedios, principalmente aves de 1º/2º año, en los que no es siempre fácil ver este carácter). En ejemplares extremos, la anchura y color de la banda azul del cuello es un carácter útil para asignar el sexo: **macho** con banda del cuello ancha de color azul-negro; **hembra** con banda del cuello estrecha de color azul-gris. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Herrerillo común. Determinación del sexo. Diseño de la banda oscura del cuello: arriba macho; abajo hembra.



Herrerillo común. Determinación del sexo. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje nuevo; mejillas amarillo claro; píleo de color gris-azulado; plumas de la cola puntiagudas.

**1º año otoño/2º año primavera** con límite de muda entre las grandes coberteras azul intenso cambiadas y las coberteras primarias **juveniles** retenidas de color azul-gris apagado; a veces con contraste entre terciarias o entre terciarias y secundarias; habitualmente con límite de muda entre el par central de plumas de la cola mudado, nuevo, más azul y con punta redondeada, que contrastan con el resto de plumas de la cola **juveniles** retenidas, más desgastadas, más grises y con punta aguda.

**Adulto** con todas las plumas del ala y cola con el mismo borde azul, sin límites de muda; mejillas blancas; píleo azulado; plumas de la cola con punta redondeada.




Herrerillo común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Herrerillo común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Herrerillo común. Determinación de la edad. Límite de muda en las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.




Herrerillo común. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial, incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, generalmente todas las grandes coberteras, algunas terciarias y el par central de plumas de la cola; algunos ejemplares la extienden a parte del álula, a todas las terciarias y desde algunos pares a todas las plumas de la cola; suele estar terminada en octubre.

**14620** **Herrerillo común** (*Cyanistes caeruleus*)



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Herrerillo común. Extensión de la muda postjuvenil.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso



Herrerillo común. 1º año. Hembra (06-XI).



Herrerillo común. Adulto. Hembra (06-I).



Herrerillo común. Juvenil (18-VI).



Herrerillo común. 1º año. Macho (06-XI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de la cabeza y anchura de la mancha del cuello: arriba macho (06-I); abajo hembra (06-I).

**14620** **Herrerillo común** (*Cyanistes caeruleus*)



Herrerillo común. Diseño de la cabeza y anchura de la mancha del cuello: arriba 1º año macho (06-XI); centro 1º año hembra (06-XI); abajo juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Diseño del píleo: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-I); derecha hembra (06-I).



Herrerillo común. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (06-XI); arriba derecha 1º año hembra (06-XI); izquierda juvenil (18-VI).



Herrerillo común. Adulto. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (06-I); abajo hembra (06-I).



Herrerillo común. Adulto. Macho: diseño del ala (06-I).



Herrerillo común. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-I).



Herrerillo común. 1º año. Macho: diseño del ala (06-XI).



Herrerillo común. 1º año. Hembra: diseño del ala (06-XI).



Herrerillo común. Juvenil: diseño de ala (14-VI).