

14640 Carbonero común (*Parus major*)



Carbonero común. Adulto. Macho (06-l).

IDENTIFICACIÓN

12-14 cm. Cabeza y cuello negros, con mancha blanca en mejilla y nuca; pecho amarillo atravesado por una banda negra; dorso verdoso; alas con una banda blanca.



Carbonero común. Diseño del dorso, pecho, nuca y ala.

ESPECIES SIMILARES

El diseño de la cabeza recuerda al **carbonero garrapinos**, que es de menor tamaño, carece de banda negra en el pecho, tiene el dorso pardo y dos bandas blancas en el ala.



Carbonero garrapinos.



SEXO


Macho con cabeza y garganta de color negro-azulado brillante; pecho y vientre con una banda ancha. **Hembra** con cabeza y garganta de color negro apagado; pecho y vientre con una banda estrecha. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Carbonero común. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



14640 Carbonero común (*Parus major*)



Carbonero común. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con el color negro y amarillo apagados; mancha amarilla de la mejilla sin borde negro a lo largo de la parte inferior; partes inferiores con la banda oscura poco desarrollada.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras mudadas, con borde azul, y las coberteras primarias **juveniles**, con bordes grises; algunos ejemplares con límite de muda entre terciarias o entre terciarias y secundarias.

Adulto con todas las plumas del ala con borde azulado, sin límites de muda.



Carbonero común. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas, medianas, grandes coberteras internas (habitualmente todas) y algunas terciarias; algunos ejemplares extienden la muda a todas las plumas del álula, a todas, algunas o ninguna pluma de la cola y a algunas secundarias internas; suele estar terminada en septiembre.



Carbonero común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo



Carbonero común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Carbonero común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso

14640 Carbonero común (*Parus major*)



Carbonero común. Adulto. Hembra (08-IV).



Carbonero común. 1º año. Macho (07-X).



Carbonero común. 1º año. Hembra (07-X).



Carbonero común. Juvenil (18-VII).



Carbonero común. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (06-I); abajo hembra (08-IV).



Carbonero común. Diseño de la cabeza: arriba 1º año macho (07-X); centro 1º año hembra (07-X); abajo juvenil (18-VII).



14640 Carbonero común (*Parus major*)





Carbonero común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (06-I); derecha hembra (08-IV).



Carbonero común. Diseño del pecho: arriba izquierda 1º año macho (07-X); arriba derecha 1º año hembra (07-X); izquierda juvenil (18-VII).



Carbonero común. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (06-I); derecha hembra (08-IV).



Carbonero común. Diseño de la nuca: arriba izquierda 1º año macho (07-X); arriba derecha 1º año hembra (07-X); izquierda juvenil (18-VII).



Carbonero común. Adulto. Diseño de las partes inferiores: izquierda macho (06-I); derecha hembra (08-IV).

14640 Carbonero común (*Parus major*)



Carbonero común. Diseño de las partes inferiores: arriba izquierda 1º año macho (07-X); arriba derecha 1º año hembra (07-X); izquierda juvenil (18-VII).



Carbonero común. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (06-I); derecha hembra (08-IV).



Carbonero común. Diseño de la cola: arriba izquierda 1º año macho (07-X); arriba derecha 1º año hembra (07-X); izquierda juvenil (18-VII).



Carbonero común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (06-I); derecha hembra (08-IV).

14640 Carbonero común (*Parus major*)



Carbonero común. Adulto. Hembra: diseño del ala (08-IV).



Carbonero común. Diseño del dorso: arriba izquierda 1º año macho (07-X); arriba derecha 1º año hembra (07-X); izquierda juvenil (18-VII).



Carbonero común. 1º año. Macho: diseño del ala (07-X).



Carbonero común. Adulto. Macho: diseño del ala (06-I).



Carbonero común. 1º año. Hembra: diseño del ala (07-X).



Carbonero común. Juvenil: diseño del ala (24-VI).