




Arrendajo. Adulto (28-II).

IDENTIFICACIÓN

32-34 cm. Plumaje de color pardo; vientre claro; capirote estriado de blanco y negro; alas oscuras con ábula y coberteras azules listadas de negro; coberteras de la cola blancas.



Arrendajo. Diseño de la cabeza y coberteras primarias



ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. **Macho** ligeramente más grande que la **hembra** pero el solapamiento es muy elevado.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil parecido al **adulto**, pero púleo solo ligeramente listado; plumaje esponjoso; plumas nuevas.

1º año otoño/2º año primavera con la gran cobertera más externa con 7 a 9 barras negras; barras negras de las plumas azules repartidas con mucha irregularidad (anchura diferente o distancia entre barras variable); si hay límite de muda en grandes coberteras las **juveniles** retenidas son más cortas; si se han cambiado todas las grandes coberteras hay diferencia en el diseño del barrado entre grandes coberteras y coberteras primarias; punta de la 5ª pluma de la cola bastante redondeada.

Adulto con la gran cobertera más externa con 9 a 12 barras negras; barras negras de las plumas azules repartidas con regularidad; no hay límite de muda en grandes coberteras; el diseño del barrado de las grandes coberteras y el de la coberteras primarias es similar; punta de la 5ª pluma de la cola bastante cuadrada.



Arrendajo. Determinación de la edad. Número de barras negras en la cobertera grande más externa: izquierda adulto; derecha juvenil.




Arrendajo. Determinación de la edad. Regularidad en el diseño de las barras negras en las coberturas primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Arrendajo. Determinación de la edad. Punta de la 5ª pluma de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberturas, de ninguna a todas grandes coberturas, de ninguna a todas las plumas del álula y a veces terciarias internas; habitualmente terminada en octubre.



Arrendajo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Arrendajo. 2º año (13-I).




Arrendajo. Juvenil (31-VII).

15390 Arrendajo (*Garrulus glandarius*)



Arrendajo. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Diseño de la cola y anchura de la 5ª pluma: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Número de barras negras en la gran cobertera más externa: arriba izquierda adulto (28-II); arriba derecha 2º año (13-I); izquierda juvenil (31-VII).



Arrendajo. Adulto: diseño del barrado en las plumas azules del ala (28-II).



Arrendajo. 2º año: diseño del barrado en las plumas azules del ala (13-I).



Arrendajo. Juvenil: diseño del barrado en las plumas azules del ala (31-VII).



Arrendajo. Adulto: diseño del ala (28-II).



Arrendajo. 2º año: diseño del ala (13-I).



Arrendajo. Juvenil: diseño del ala (31-VII).