



Picogordo. Primavera. Adulto. Macho (15-III).

IDENTIFICACIÓN

17-18 cm. Pico cónico muy grueso; cabeza con lista negra alrededor del pico y en el mentón; collar grisáceo; dorso pardo con obispillo ocre; partes inferiores gris vinoso; cola con plumas negras terminadas de blanco; ala con mancha blanca en las primarias; secundarias con banda externa negro brillante en el macho, gris en la hembra.




Picogordo. Diseño de cabeza y dorso.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO



Ambos sexos con aspecto similar, si acaso macho con castaño intenso en la cabeza; barba externa de las secundarias externas de color negro brillante; longitud de la mancha blanca de la barba interna de la pluma más externa de la cola 17-28 mm. Hembra con castaño apagado en la cabeza; barba externa de las secundarias externas de color gris oscuro; longitud de la mancha blanca de la barba interna de la pluma más externa de la cola 9-21 mm.



Picogordo. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Invierno. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Picogordo. Determinación del sexo. Diseño de secundarias: izquierda macho; derecha hembra..


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con el plumaje nuevo; cabeza, cuello y pecho amarillentos; partes inferiores con moteado oscuro; mentón sin babero negro.

1º año otoño/2º año invierno con las plumas de la cola desgastadas y puntiagudas (si no las han mudado todas); si han mudado el par central hay contraste con el resto; ala con límite de muda entre las grandes coberteras mudadas y retenidas; si las han mudado todas o no han cambiado ninguna, entonces el límite está entre las plumas del álula y/o terciarias. (**CAUIDADO:** no siempre fácil de ver). En **machos**, la barba externa de la pluma de la cola más externa es pardo-gris, con una mancha blancuzca en la punta (**CAUIDADO:** algunos **machos** no la tienen); la barba externa de la 5ª primaria mide 3,5-5,8 mm de ancha; la punta de la 7ª primaria puede a veces tener menos brillo que en **adultos**; la punta de la 8ª primaria no tiene nunca brillo. En **hembras** la barba externa de la 5ª primaria mide 3-4 mm de ancha; la punta de la 7ª primaria tiene brillo sólo en muy pocos ejemplares; la punta de la 8ª primaria no tiene nunca brillo.

Adulto con las plumas del ala y la cola de la misma generación; plumas de la cola nuevas y cuadradas. En **machos** la barba externa de la pluma de la cola más externa es de color negro, con una mancha blanco puro en la punta (**CAUIDADO:** algunos **machos** no la tienen); la barba externa de la 5ª primaria mide 5-7,2 mm de ancha; la punta de la 7ª primaria siempre con brillo intenso; la punta de la 8ª primaria tiene brillo frecuentemente. En **hembras** la barba externa de la 5ª primaria es de 4-7,2 mm de ancha; la punta de la 7ª primaria siempre con brillo; la punta de la 8ª primaria tiene brillo en algunos ejemplares.




Picogordo. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil (Foto: Ondrej Kauzal).




Picogordo. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: arriba izquierda adulto con mancha blanca en la punta; arriba derecha adulto sin mancha blanca en la punta; izquierda 1º año.




Picogordo. Adulto. Macho. Determinación de la edad: extensión del brillo en primarias.



Picogordo. 1º año. Hembra. Determinación de la edad: extensión del brillo en primarias.




Picogordo. Adulto. Hembra. Determinación de la edad: extensión del brillo en primarias.



Picogordo. 1º año. Macho. Determinación de la edad: extensión del brillo en primarias.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas, medianas y habitualmente todas las grandes coberteras; algunos ejemplares extienden su muda a terciarias; la muda de las plumas de la cola es muy variable, la mayor parte muda solo el par central, pero pueden mudar toda la cola o ninguna pluma; terminada en noviembre.



Picogordo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Picogordo. Primavera. Adulto. Hembra (02-V)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Macho (16-VII)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Macho (15-IV)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Hembra ().



Picogordo. Primavera. 2º año. Hembra (15-IV)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (15-III); abajo hembra (02-V)
(Foto: Ondrej Kauzal)


17170 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)



Picogordo. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal); abajo hembra (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal); derecha hembra (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal).




Picogordo. Primavera. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal); abajo hembra (23-VI) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Picogordo. Primavera. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal); derecha hembra (23-VI) (Foto: Reinhard Vohwinkel).



Picogordo. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (15-III); derecha hembra (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (15-III); derecha hembra ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Picogordo. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Picogordo. Primavera. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().



Picogordo. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (15-III); derecha hembra (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: arriba macho (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal); abajo hembra (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal); derecha hembra (01-IX) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Primavera. Adulto. Macho: diseño del álula y coberteras primarias (15-III).




Picogordo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del álula y coberteras primarias (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Macho: diseño del álula y coberteras primarias (15-IV)
(Foto: Ondrej Kauzal).




Picogordo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del álula y coberteras primarias (15-IV)
(Foto: Ondrej Kauzal).




Picogordo. Primavera. Juvenil. Macho: diseño del álula y coberteras primarias (16-VII)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño del álula y coberteras primarias (01-IX)
(Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (15-III).




Picogordo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)




Picogordo. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Primavera. Juvenil. Macho: diseño de primarias (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (01-IX) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias (15-III).



Picogordo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal)




Picogordo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Primavera. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (01-IX) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (15-III)



Picogordo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (02-V) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (15-IV) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Primavera. Juvenil. Macho: diseño del ala (16-VII) (Foto: Ondrej Kauzal)



Picogordo. Invierno. Adulto. Hembra (10-I).



Picogordo. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño del ala (01-IX) (Foto: Ondrej Kauzal).



Picogordo. Invierno. 1º año. Macho (29-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Macho (26-XII).



Picogordo. Invierno. 1º año. Hembra (26-XII).

17170 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)



Picogordo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (26-XII); abajo hembra (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (29-XII); abajo hembra (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (26-XII); derecha hembra (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (26-XII); derecha hembra (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (26-XII); derecha hembra (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (29-XII); derecha hembra (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala y coberteras primarias (26-XII)




Picogordo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala y coberteras primarias (10-I).




Picogordo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala y coberteras primarias (29-XII).




Picogordo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala y coberteras primarias (30-X).




Picogordo. Invierno. Adulto. Macho: diseño de primarias (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño de primarias (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Macho: diseño de primarias (29-XII).



Picogordo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño de primarias (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Macho: diseño de secundarias (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (10-I).



Picogordo. Invierno. 1º año. Macho: diseño de secundarias (29-XII).



Picogordo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño de secundarias (26-XII).



Picogordo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (26-XII)



Picogordo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-I)



Picogordo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (29-XII)



Picogordo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (26-XII)